



www.pediatric-rheumatology.printo.it

Reumatska Groznica I Pos-Streptokokni Reaktivni Artritis

To Je To ?

Bolest Koja Nastaje Nakon Infekcije Uzrokovane Streptokokm . Bolest Moæe Trajno Opetiti Srce, Uz Artritis Karditis I Napraviti Smetnje Na Koæi (Osipi I Noduli).

Koliko Je »Esta Bolest?

Nekad Je Bila Èesta Dok Nije Dozlo Doba Raznih I Jakih Antibiotika . (Penicilin).Javlja Se I Kod Djece I Adolescenata ,Zbog Toga Jer Se Javlja U Kombinaciji S Promjenama Na Zglobovima . Javlja Se U Dobi Od 5-15 God. Se Incidencijom Oko 8 God . Dolazi Do Abnormalnog Imunološkog Odgovora Organizma Nakon Infekcije Streptokokom .Bolest Nije Nasljedna Ali Se Jedino Moæe Prenjeti Uzroènik -Streptokok (Streptokokni Faringitis).U Respiratornom Kontaktu ;Ikola ,Vrtiê, Posao I Ostalo . Zato Je Bitno Svaku Infekcije (Angina)Shvatiti Ozbiljno I Bitno Je Pravovremeno Djelovati . Teško Je Predvidjeti Da Li Èe Djece Dobiti Bolest Ili Ne , Ali Je Bitna Prevencija Bolesti I Antibiotiska Zaptita Prilikom Infekcije Grla . Uzeti Brigs Grla Koji Èe Nam Pokazati O Kakvoj Infekciji Se Radi .

Koji Su Glavni Simptomi Bolesti ?

Bolest Je Kod Svakog Djeteta Individualna , Ali Se Javlja Upala Grla ,Tonzilitis I Faringitis Streptokokni . Javlja Se Povišena Temperatura , Upaljeno Grlo , Glavobolja , Tonzilitis , Purulentna Sekrecija ,Krvarenje Iz Nosa I Povećani Limfni Èvorovi Na Vratu , Koji Su I Bolni .Tako Er Se Javlja I Funkcionalni Distres ,Gubitak Apetita . Javlja Se: **Artritis** (Koljena , Laktovi, Èlanci I Ramena) ,Upala Prelazi S Jednog Zgloba Na Drugi I Ukljuèuju Se I Kraljeænica I Ruke . Bitno Je Napomenuti Da Bol Prestaje S Primjenom Nesteroidnih Protupalnih Lijekova .

Karditis -Znaèi Upala U Srèanom Mišiu I To Je Vrlo Ozbiljno Stanje ,Javlja Se Prilikompreglada (Slušanja) Mumorenje . A Moæe Doèi I Do Endokarditisa (Upala U Srèanim Valvulama) . Srce Je Oslabljeno I Imflamirano . Javlja Se Bol U Prsima , Teško Disanje , Kapalj . Ukljuèuje Se Kariolog Radi Terapije . .Korea - Iz Grèke Rijeèa Ito Znaèi -Plesanje ;Javlja Se Poremeèaj U Mozgu .Poremeèaj Kordinacije Pokreta.Javlja Se Kod 10- 30 % Pacijenata . I Javlja Se Kao I Drugi Simptomi Nakon 6 Mj. Od Poætka Streptokokne Infekcije Grla .

Glavna Obiljeæja Su ; Oteæano Oblaèwnje , Hodanje , Njegae I Hranjenja ,Te Se Rukopis Nagr Uje Kod Djece Koja Pitu .

Eritrema Marginatum -Zadnje Glavno Obiljeæje Bolesti . Javlja Se Kod Najmanje 5 % Djece Kao Zmijin Ugriz .

Bolest Nije Jednaka Kod Svakog Djeteta Ovisno O Simptomima Bolesti Koji Se Jave . To Je Bolest Ikolske Dobi I Adolescenata I To Najèeèe Prije 25 God . Æivota .

Kako Se Dijagnosticira ?

Klinička Slika Je Vrlo Bitna U Kombinaciji S Dijagnostikom Jonesovim Kriterijima. Praćenje Djeteta Nakon Streptokoka , Te Kontrola Krvi I Urina Tijeko Upale I Nekoliko Mjeseci Nakon .Bitna Je Predoæba Da Je Bio Prisutan Streptokok I Porebno Je Uzeti Bris Grla Koji To I Dokazuje . Vadi Se Cijela Biokemija I To Posebno Ast -Titar I Koji Moæe Biti Jako Visok Pa Se To I Kontrolira . Rtg Je Bitan Kao I Uzv Srca ,Dopler Srca I Sræani Enzimi . Bitno Je Da Djete Uz Reumatologa Pregleda I Kardiolog ,Koji Je Specijalista Za Sræane Smetnje .

Kako Se Lije»I Bolest ?

U Prvom Stadiju Daju Se Antibiotici Koji Reagiraju Na Streptokoka Koji Je Izoliran Antibiogramom . Daje Se Penicilin Koji Daje Zærtitu Kroz 43-4 Tjedna . Tako Er Se Daju Nsaid Dok 6-8 Tjedana Dok Ne Nestane . Kod Nekih Se Daju I Steroidi (Prednison),Koji Se Preporuæa Na 2-3 Tjedna . Kod Koree-Haloperidol, I Valproic .Nus Pojave Se Mogu Kontrolirati Kroz Praćenje Djeteta (Spavanje I Tresenje) .Ali Ponekad Korea Moæe Trajati Mjesecima Dok Se Ne Na E Adekvatna Terapija.

Koje Su Nus Pojave Terapije ?

Salicilati I Nesteriodna Protuupalna Terapija Se Dobro Podnosi Dok Su Nus Pojave Nakon Primjene Sterioda Teæe Podnose . Javlja Se Poremeæaj Tjelesne Teæine ,Akne ,Strije , I Porast Dlakavosti . Jedino Treba Biti Oprezan S Penicilinom Na Kojeg Djeca Mogu Imati Alergiju.Primjenjuje Se S Lidokainom Jer Njegova Primjena Intramuskularna Boli Pa Se Djeci Pokuæava Omoguæiti Injekcije Sa Ito Manje Boli .

Koliko Dugo Treba Trajati Sekundarna Prevencija?

Postije Rezultati Oko 3-5 Godina Od Pojave Simptoma . Bitno Je Kontrolirati Takvu Djecu Radi Remisija Bolesti . Mnogi Specijalisti Bi Se Sloæili Da Je Potrebno Davati Antibiotike Do 5 Godina .Ili Dok Ne Napuni 18 God . Bez Smetnji Na Srcu A Ako Postoje Smetnje Srca Onda Se Primjanjuju Do 40 God. Potrebno Je Prevenirati Bakterijske Infekcije Radi Endokarditisa Antibioticiama .Tako Er Je Potrebno Obratiti Pozornost I Kod Zubara(Popravak Zuba I Operacija) Jer Bakterija Iz Bilo Kojeg Djela Moæe Naækoditi Djetetu I Izazvati Infekciju Sræanog Miæiæa . Bolest Moæe Trajati Dugo Ali Ju Je Bitno Nadzirati Radi Terapije I Nastavka Ljeæenja . Ozbiljna Sræana Oæteæenja Mogu Dvesti I Do Potreba Za Operacijom .

Prognoza Bolesti

Potpuni Oporavak Je Moguæ Ako Karditis Nije Imao Trajne Posljedice .

Dnevni Ritam

Vrlo Je Bitna Potpora Obitelji Pogotovo Kod Koreei Karditisa . Artritis Se Uglavnom Tetira S Nsaid. Lijekovima . Naravno Da Je Najbitniji Klinæko Stanje Djeteta Koje Je Individualno Za Svako Djete I O Tome Ovisne Dnevne Aktivnosti (Sport ,Iklola I Ostalo) . Bitno Je Praćenje Djeteta I Ovisno O Njegovim Moguænostima I Volji Provoditi Dnevne Ktivnosti .

Poststreptokokni Artritis

Artritis Se Javlja U Prvim Fazama Nakon Prebolje Infekcije Streptokokom , I Traje Mjesecima . Neki Od Tih Pacijenata Razviju Kasnije Karditis .