



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

কোলচসিনি

বরণনা

কোলচসিনি শতাব্দী ধরে পরিচিত। ইহা কোলচিকাস বিজ হতে তৈরী, যা ললিয়াছ ফ্যামলি হতে এসছে। ইহা শ্বতে রক্তকনিকার কাজ এবং সংখ্যা কমায় এভাবে প্রদাহ প্রতিরোধ করে।

ঔষধ এর মাত্রা/ প্রয়োগের ধরন

১.৫ মগগ্রাম প্রতিদিন মুখে। কিন্তু ক্ষেত্রে বেশী মাত্রার (২-২.৫ মগ) প্রয়োগ হয়। বিরল ক্ষেত্রে, শরীপথে ব্যবহৃত হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রধান প্রধান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খাদ্যনালী সংক্রান্ত যমেন-বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, উদরাময়, পটে ব্যাথা যা লকেটে এস ছাড়া খাবারে উন্নত হয়। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত কিছু সময়ে জন্ম স্বল্প মাত্রার ঔষধ দলে উন্নত হয়।

এই উপসর্গ চলে যাওয়ার পর ঔষধ এর মাত্রা বাড়িয়ে সঠিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে রক্তে কনিকা কমে যতে পারে। তাই মাঝে মাঝে রক্ত কনিকা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

যাদের কডিনী এবং লভিররে সমস্যা রয়েছে তাদের মাংসপেশীতে দুর্বলতা দেখা দেয়। ঔষধ বন্ধ করলে খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা দূর হয়ে যায়।

আরকেটি সমস্যা হলে টেফায়ুর পরেফিরোল নডেরে পথে, এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নত হয়। ব্যাথা এবং চুল পড়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

বেশী মাত্রার ঔষধ খলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকে বেশী হয়। কোলচসিনি এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জন্ম চিকিৎসার প্রয়োগ হয়। ধীরে ধীরে উন্নত হয় কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বেশী মাত্রা প্রানঘাতী। অভিব্যককে খোয়াল রাখতে হবে যনে তা ছোট ছোট বাচচারা নাগাল না পায়। ফ্যামলিয়াল মডেটিনেনিয়ান জ্বরে গরভকালীন সময়ে কোলচসিনি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে।

প্রধান রডিমাটিকি রোগসমূহ
ফ্যামলিয়াল মডেটরনেয়ান ফভির
আরও কিছু অটোইফলেমটেোরী রোগ রকিারসেট পরেকিারডিইটসি।