



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিসরণ 2016

মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি

বরণনা

কছু রডিমাটিক রোগে কষতেরে ট্রমডিন সিসিটেমে বেশী সক্রিয় হয়ে যায়। মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি বিএবং টি লসিকে সাইট এর বৃদ্ধিকে রহতি করে। এর ফলে ইমডিন সক্রিয় কেষ তরী হতে পারে। এই ঔষধ এর কার্যকারিতা এই কারনই পাওয়া যায় এবং কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।

মাত্রা/ পরয়ে গরে ধরন

এই ঔষধ বড়ি অথবা সাসপেনশন তরীর পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। ১-৩ গ্রাম/পরতদিনি মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি খাবারের সাথে খাওয়া যাবে না কনেনা এটা ঔষধ শে ষনকবে ব্যাহত করে। ঔষধ খতে ভুলে পরবর্তী ডোজ এর সমচ দ্বগ্নি ডোজ খাওয়া যাবে না। ঔষধটি ভালভাবে সংরক্ষন করতে হবে। শরীরে ঔষধ এর মাত্রা নরিপন করার জন্য একই দিনে বিভিন্ন রক্তের নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। যা পরত্যকে রোগীর কষতেরে ঔষধ এর মাত্রা ঠিক করতে সাহায্য করবে।

পারশ্বপরতকিরিয়া

১০-৩০ ভাগ রোগীর কষতেরে খাদ্যনালী সংক্রান্ত পারশ্ব পরতকিরিয়া যমেন-ডায়ারিয়া/উদরাময়, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া অথবা কেষ্টকাঠনিয় হতে পারে। যদি পারশ্ব পরতকিরিয়া রয়ে যায় তাহলে অল্প মাত্রার ঔষধ অথবা একই রকম অন্য একটা ঔষধ দয়ো যতে পারে। এই ঔষধে শ্বতে অথবা অনচক্রিকা কমে যতে পারে, তাই পরতমাসে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। শ্বতেকনিকা বা অনুচক্রিকা কমে গেলে ঔষধ বন্ধ করতে হবে।

এই ঔষধে শরীরে সংক্রমন হতে পারে। এই ঔষধ শরীরেরে রোগ পরতরিে গ কষমতা বসিয়ে দেয়ে এজন্য লাইভ ভ্যাকসনি এ বধিয় পরতকিরিয়া হতে পারে। এজন্যে লাইভ ভ্যাকসনি যমেন-মসিলস নয়ো যাবে না। টীকা নেওয়ার পূর্বে অথবা বদিশে ভ্রমনেরে পূর্বে চকিৎসকরে পরামশ্য ননি। এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে গরভধারন করা যাবে না। নয়িমতি শারীরিক নরীক্ষা এবং রক্ত ও পর্রাব পরীক্ষা করা দরকার যনে পারশ্ব পরতকিরিয়া নরিপন করা যায়।

পরধান রডিমাটিক রোগসমূহ

জুভনোইল সসিটমেকি লুপাস ইরাই থমেটেোসাস