



[www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro](http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro)

## ড্রাগ থেরাপি

বিসরণ 2016

### মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি

#### বরণনা

কছু রডিমাটিক রোগে কষতেরে ট্রমডিন সিস্টেমে বেশী সক্রয়ি হয়ে যায়। মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি বিএবং টি লসিকে সাইট এর বৃদ্ধিকে রহতি করে। এর ফলে ইমডিন সক্রয়ি কেষ তরী হতে পারে। এই ঔষধ এর কার্যকারতি এই কারনই পাওয়া যায় এবং কয়কে সপ্তাহ সময় লাগে।

#### মাত্রা/ পরয়ে গরে ধরন

এই ঔষধ বড়ি অথবা সাসপনেশন তরীর পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। ১-৩ গ্রাম/পরতদিনি মাইকোফেনে লেটে মাফটেলি খাবারের সাথে খাওয়া যাবে না কনেনা এটা ঔষধ শেষনকবে ব্যাহত করে। ঔষধ খতে ভুলে পরবর্তী ডোজ এর সমট দ্বগ্নিন ডোজ খাওয়া যাবে না। ঔষধটি ভালভাবে সংরক্ষন করতে হবে। শরীরে ঔষধ এর মাত্রা নরিপন করার জন্য একই দিনে বিভিন্ন রকতরে নমূনা পরীক্শা করতে হবে। যা পরতযকে রোগীর কষতেরে ঔষধ এর মাত্রা ঠকি করতে সাহায্য করবে।

#### পারশ্বপরতকিরিয়া

১০-৩০ ভাগ রোগীর কষতেরে খাদয়নালী সংকরানত পারশ্ব পরতকিরিয়া যমেন-ডায়ারিয়া/উদরাময়, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া অথবা কেষ্টকাঠনিয় হতে পারে। যদি পারশ্ব পরতকিরিয়া রয় যায় তাহলে অল্প মাত্রার ঔষধ অথবা একই রকম অন্য একটা ঔষধ দয়ো যতে পারে। এই ঔষধে শ্বতে অথবা অনচকরকিা কমে যতে পারে, তাই পরতমাসে রকত পরীক্শা করতে হবে। শ্বতেকনকিা বা অনুচকরকিা কমে গেলে ঔষধ বন্ধ করতে হবে।

এই ঔষধে শরীরে সংকরমন হতে পারে। এই ঔষধ শরীরেরে রোগ পরতরিে গ কষমতা বসয়ি দেয় এজন্য লাইভ ভ্যাকসনি এ বযিয় পরতকিরিয়া হতে পারে। এজন্যে লাইভ ভ্যাকসনি যমেন-মসিলস নয়ো যাবে না। টীকা নেওয়ার পূর্বে অথবা বদিশে ভরমনরে পূর্বে চকিৎসকরে পরামশ্য ননি। এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে গরভধারন করা যাবে না। নয়িমতি শারীরকি নরীক্শা এবং রকত ও পর্রাব পরীক্শা করা দরকার যনে পারশ্ব পরতকিরিয়া নরিপন করা যায়।

#### পরধান রডিমাটিক রোগসমূহ

---

জুভনোইল সসিটমেকি লুপাস ইরাই থমেটেোসাস