



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

## ড্রাগ থেরাপি

বিসরণ 2016

### সাইক্লোসেপেরিনি-এ

#### বরণা

এটা ইমডিনে। সাপ্রেসেডি ঔষধ প্রাথমিক ভাবে এটা যসেকল রোগীদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন হতে। তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে।। কিন্তু এখন রিউমটিকি রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা শ্বতে রক্ত কনিকা কে প্রতিহিত করে যা ইমডিনে। রসেপন্স এর জন্য দরকারী

#### মাত্রা

সরিপ অথবা বড়ি, ৩-৫ মগ্নাম/কজে/প্রতিদিন দুইভাবে দয়ো যাবে।

#### পারশ্বপ্রতিক্রিয়া

পরশ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত বেশী দেখা যায়, বেশী মাত্রায় হয় এবং তখন ঔষধ বন্ধ করতে হয়। তা হল কডিনীর ক্ষতি, এক রক্ত চাপ, লভিরে সমস্যা, মাড়ি ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত লোম, বমি বমিভাব ও বমি হওয়া।

তাই সাইক্লোসেপেরিনি দেওয়ার পর নিয়মিত ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরটেরী পরীক্ষা করতে হবে পরশ্ব প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য বাচ্চাদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচলা পরীক্ষা করতে হবে।

প্রধান শিশু রিউমটিকি রোগ যাত্রে দয়ো যায়।

ম্যাক্রোফেজে একটিশেন সনিড্রোম

জুবনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস