



www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

সাইক্লোসেপেরিন-এ

বরণা

এটা ইমিউনোসাপ্রেসেডি ঔষধ প্রাথমিক ভাবে এটা যেকোন রোগীদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন হতে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে। কিন্তু এখন রিউমটিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা শ্বতে রক্ত কনিকা কে প্রতিহিত করে যা ইমিউনোসাপ্রেসেপনস এর জন্য দরকারী

মাত্রা

সরিপ অথবা বড়ি, ৩-৫ মিলিগ্রাম/কজে/প্রতিদিন দুইভাবে দেয়া যাবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

পরশ প্রতিক্রিয়া সাধারণত বেশী দেখা যায়, বেশী মাত্রায় হয় এবং তখন ঔষধ বন্ধ করতে হয়। তা হল কডিনীর ক্ষতি, এক রক্ত চাপ, লিভারের সমস্যা, মাড়ি ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত লোম, বমি বমিভাব ও বমি হওয়া।

তাই সাইক্লোসেপেরিন দেওয়ার পর নিয়মিত ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরটেরী পরীক্ষা করতে হবে পরশ প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য বাচ্চাদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচলা পরীক্ষা করতে হবে।

প্রধান শিশু রিউমটিক রোগ যাত্রে দেয়া যায়।

ম্যাক্রোফেজ এক্টিভেশন সনিড্রোম

জুবনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস