



SHARE



PREs
paediatric
rheumatology
european
society

www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

সাইক্লোসফসাইড

বননা

টা একটা ইমউনোসাপ্রসেসিভ ঔষধ যা ইমউনোসিসিটমেকে দমায়ে রাখে এবং প্রদাহ কমায়। ইহা কাজ করে কেষরে বিভিন্ন প্রতাহিত করে, ডি.এন.এ উৎপাদন বন্ধ করে এবং এজন্য ইহা কাজ করে এসব কেষরে উপর যারা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় যমেন-রক্ত কেষ, চুল এবং খাদ্যনালীর কেষ। শ্বতেরক্কনিকা তার মধ্যে লসিফে বাটে সবচেয়ে বেশী হয় যাতো বুঝা যায়, ইমউনোসিসিটে সাপ্রেশন/ব্যাহত হয়েছে। সাইক্লোসফসাইড বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন রিউমাটিক রোগ এ সাথে সাথে ব্যবহৃত হয়। যার জন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ক্যান্সার রোগীদের থেকে কম হয়।

মাত্রা /প্রয়োগের ধরন

এর মাত্রা হচ্ছে ১-২ মগিগ্রাম/কজে/প্রতদিনি মুখে অথবা শরিপথে ০.৫-১ গ্রাম/মিঃ বডিসারফসে এরিয়া প্রতমাসে একবার ৬মাস এবং তারপর প্রতি ৩ মাস পর পর ২ বার অথবা ৫০০মগিগ্রাম/মিঃ বডিসারফসে এরিয়া প্রতি ২ সপ্তাহ পর পর মোট ৬ টি ডোজ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ইহা এমন একটা ঔষধ যা ইমউনটিকি ব্যবহৃত করে এবং অনেকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যার জন্য নবিডি ল্যাবরটেরী পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। সবচেয়ে বেশী হচ্ছে বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া, পরবর্তনযে গ্য চুল পাতলা হয়ে যাওয়া।

শ্বতেরক্কনিকা এবং অনুচক্রিকা কমে যতে পারে যার জন্য ঔষধ এর মাত্রা কমাতে হতে পারে অথবা সময়কিভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে।

শ্বতেরক্কনিকা এবং অনুচক্রিকা কমে যতে পারে যার জন্য ঔষধ এর মাত্রা কমাতে হতে পারে অথবা সময়কিভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে।

শ্বতেরক্কনিকা এবং অনুচক্রিকা কমে যতে পারে যার জন্য ঔষধ এর মাত্রা কমাতে হতে পারে অথবা সময়কিভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে।

প্রধান শিশু রডিমাটিকি রোগ সমূহ
জুভনোইল সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথসেটেসিস
সিস্টেমিক ভাসকুলাইটিস