



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

ববিরণ 2016

লফিলে নো নামাইড

বরণনা

লডিফে নামাইড একটা বিকল্প ঔষধ, সসেব রোগীদের জন্য যাদের উপর মথে ট্রাকস্টে কাজ করনা। যাই হোক, শিশু বাতরোগে জন্য এই ঔষধ এর অভিজ্ঞতা বরিল এবং এই ঔষট শিশু বাত রোগ রোগে কষত্রে ব্যবহারে জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিনেই।

ঔষধ এর মাত্রা

যসেব শিশুদের ওজন ২০ কজেরি কম তারা প্রতদিনি ১০০ মগিগ্রাম লডিফে নামাইড এক দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে ১০ মগিগ্রাম একদিন পর পর খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ২০-৪০ কজেরি তারা ১০০ মগিগ্রাম লডিফে নামাইড দুদিন, পরবর্তীতে ১০ মগিগ্রাম প্রতদিনি খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ৪০ কজেরি বেশী, তারা ১০০ মগিগ্রাম লফিলে নো নামাইড তনি দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে প্রতদিনি ২০ মগিগ্রাম।

পারশ্বপ্রতিক্রিয়া

যহেতু লডিফে নামাইড গরভাস্থায় ভ্রূণের জন্য কষতিকারক তাই গরভাস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না এবং অবশ্যই এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে জনমনয়িন্ত্রন ব্যবস্থ গ্রহন করতে হবে।

কোন কোন শিশু রডিমাটিক রোগে কষত্রে দেয়া যাবে

শিশু বাত রোগ