



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

ববিরণ 2016

লফিলোনে ইনামাইড

বরণনা

লডিফোনে ইনামাইড একটা বিকল্প ঔষধ, সসেব রোগীদের জন্য যাদের উপর মথে ট্রাকস্টে কাজ করনা। যাই হোক, শিশু বাতরোগে জন্য এই ঔষধ এর অভিজ্ঞতা বরিল এবং এই ঔষট শিশু বাত রোগে রোগে কষত্রে ব্যবহারে জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিনই।

ঔষধ এর মাত্রা

যসেব শিশুদের ওজন ২০ কজেরি কম তারা প্তদিনি ১০০ মগিগ্রাম লডিফোনে ইনামাইড এক দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে ১০ মগিগ্রাম একদিন পর পর খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ২০-৪০ কজেরি তারা ১০০ মগিগ্রাম লডিফোনে ইনামাইড দুদিন, পরবর্তীতে ১০ মগিগ্রাম প্তদিনি খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ৪০ কজেরি বেশী, তারা ১০০ মগিগ্রাম লফিলোনে ইনামাইড তনি দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে প্তদিনি ২০ মগিগ্রাম।

পারশ্বপ্তকির্য়া

যহেতু লডিফোনে ইনামাইড গরভাস্থায় ভ্রূনের জন্য কষতিকারক তাই গরভাস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না এবং অবশ্যই এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে জন্মনয়িন্ত্রন ব্যবস্থ গ্রহন করতে হবে।

কোন কোন শিশু রডিমাটিকি রোগে কষত্রে দেয়া যাবে

শিশু বাত রোগ