www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

লেফলুনোমাইড

বর্ণনা
লেফলুনোমাইড একটি বিকল্প ঔষধ, সেসব রোগীদের জন্য যাদের উপর মেথোট্রেক্সেট কাজ করে না। যাই হোক, শিশু বাতরোগের জন্য এই ঔষধ এর অভিজ্ঞতা বিরল এবং এই ঔষটি শিশু বাত রোগ রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই।

ঔষধ এর মাত্রা
যেসব শিশুদের ওজন ২০ কেজির কম তারা প্রতিদিন ১০০ মিঃগ্রাম লেফলুনোমাইড এক দিনের জন্য খেতে পারবে, পরবর্তীতে ১০ মিঃগ্রাম একদিন পর পর খেতে পারবে। যেসব শিশুদের ওজন ২০-৪০ কেজি তারা ১০০ মিঃগ্রাঃ লেফলুনোমাইড দুদিন, পরবর্তীতে ১০ মিঃগ্রাম প্রতিদিন খেতে পারবে। যেসব শিশুদের ওজন ৪০ কেজির বেশী, তারা ১০০ মিঃগ্রাঃ লেফলুনোমাইড তিন দিনের জন্য খেতে পারবে, পরবর্তীতে প্রতিদিন ২০ মিঃ গ্রাম।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
যেহেতু লেফলুনোমাইড গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের জন্য ক্ষতিকারক তাই গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না এবং অবশ্যই এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থ গ্রহন করতে হবে।

কোন কোন শিশু রিউমাটিক রোগের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে
শিশু বাত রোগ