



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

## দীর্ঘময়োদী অসংক্রমন অষ্টাওমাই লাইটসি/অষ্টারাইটসি (অথবা সআরএমও)

ববিরণ 2016

সআরএমও কী?

### ১.১ এটা কী?

দীর্ঘময়োদী পুনঃসংঘটিত রক্তস্থায়ী অষ্টাওমাইলাইটসি বশীর ভাগ সময়ই খুব মারাত্মক রকম দীর্ঘময়োদী আজীবন ঘটতি অষ্টাওমাইলাইটসি। শিশুরও কশিে ারদরে ক্ষতেরে পুরদাহরে ক্ষত মূলত লম্বা অস্থিরি মটোফাইসসিকো আক্রান্ত করে। যাহে াক ক্ষত অস্থিরি যকো ান জায়গায় হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য অঙ্গ, যমেন চমর, চক্ষু, পরিপিকতন্ত্র এবং অস্থি সন্ধি আক্রান্ত হতে পারে।

### ১.২ এর প্রাদুর্ভাব কমন ?

এই রোগে প্রাদুর্ভাব বিস্তারতি গবেষণা করা হয়নি। ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল রেজিস্ট্ররি তথ্য অনুযায়ী প্রায় দশ হাজারে মধ্যে ১-৫ জন অধিবাসী আক্রান্ত হতে পারে। এতে কে ান লঙ্গি প্রাধান্য নেই।

### ১.৩ রোগের কারণগুলো কী?

কারণ অজানা, ধারণা করা হয় যে সহজাত ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার এই রোগটির যোগসূত্র থাকতে পারে। অস্থি বিপাকীয় কিছু দুর্লভ রোগ সএনওর মত মনে হয়, যমেন হাইপোফসফাটশেয়া, কামুরাত এনজলেমেনে সনিড্রোম, বনোইন হাইপার অষ্টোসিসি প্যাকাইডামে ারে অষ্টোসিসি এবং হিষ্টাওসাইটোসিসি।

### ১.৪ এটা কী বংশগত ?

বংশগত প্রমাণতি নয়, তবে ধারণা করা হয়, কিছু সংখ্যক রোগীর ক্ষতেরে এটা বংশগত।

### ১.৫ আমার শিশুর এই রোগ কনে হয়েছে ? এটা কি প্রতর্নিত্র াধযে াগ্য ?

কারণগুলো া এখনও অজানা। প্রতর্নিত্র াধ ব্যবস্থাও অজানা।

১.৬ এটা কী ছয়োচে অথবা সংক্রামক ?

না, তা নং, সম্প্রতিক গবেষণায় কোন সংক্রামক বস্তু (যেমন ব্যাকটেরিয়া) পাওয়া যায় নাই।

১.৭ প্রধান উপসরগগুলিকী ?

রোগীরা সাধারণত অসুস্থি অথবা অসুস্থি সন্ধরি ব্যাথা অভয়িগ করে আর তাই পার্থক্য মূলক ডায়াগনোসিসিরে মধ্যে আছে ডুভলাইল ইডওপ্যাফকি আথরাইটসি এবং ব্যাকটেরিয়াল অতষ্টিওসাইলাইটসি। ডাক্তারী পরীক্ষায় বশেরিভাগ রোগীর ক্ষতেরে প্রধানত অসুস্থি সন্ধরি প্রদাহ দেখা যায়। স্থানীয় অসুস্থি ফিলা এবং ব্যাথা সাধারণ এবং খুড়িয়ে চলা ও কার্যকারী দেখা যায়। এই রোগ দীর্ঘময়োদী ও পুনঃপুন সংঘটিতি হতে পারে।

১.৮ প্রতীশিশুর ক্ষতেরে রোগটিকি একই রকম ?

হা, প্রত্যকে শিশুর ক্ষতেরে একই নয়। তার উপর আক্রান্ত অসুস্থিতির প্রকার, রোগেরে ময়োদ এবং উপসরগেরে তীব্রতা তারতম্য হয় এবং যদি পুনঃপুন সংঘটিতি হয় তাহলে একই শিশুর ক্ষতেরেও রোগেরে তারতম্য হতে পারে।

১.৯ বড়দরে রোগেরে থেকে শিশুদরে রোগ কী আলাদা ?

সাধারণত শিশুদরে সআরএমও বড়দরে মতই হয়। তবে রোগটির কিছু উপসরগ যেমন চ্য সেরিয়াসসি, পাসটুলার একনটি বশে আক্রান্ত হয়। বয়সতদরে ক্ষতেরে রোগটিকি এমএপিএইচও সনিড্রোম ডাকা হয় সাইনোসাইটিস, একনটি, পাসটুলোসিস এবং অস্টিয়াইটসি। সআরএমওকে এসএপিএইচও সনিড্রোম এর শিশুও কশিার সংক্সরন হসিবে বিবেচনা করা হয়।

২. রোগ নরিণয় এবং চকিৎসা।

২.১ কভাবে রোগ নরিণয় করা হয় ?

সনিও/সআরএমও একটি বরজন ভিত্তিকি রোগ নরিণয়। গবেষণাগারেরে স্থতিমাপ দিয়ে সআর এমও/সএনও ধারণা করা যায় না। রডেওগরাফী দ্বারা সএনও অসুস্থি ক্ষতেরে প্রারম্ভিকি পরবিরতন ধরা পড়ে না যদিও রোগেরে পরবর্তী পরবর্তী ধাপে লম্বা অসুস্থি ও কলভেকিও অস্টিওপ্লাস্টিকি এবং স্কেরেটিকি পরবিরতন সএনও নরিদশেক। ভটবিরাল কমপ্রেশন পরবর্তী রডেওগরাফকি চহিন, তবে অন্যান্য পাথক্যমূলক ডায়াগনোসিসি যেমন-ম্যালগিন্যান্সী ও অস্টিওপেরোসিসি বিবেচনা করতে হবে। সএনও রোগ নরিণয় তাই ইমজেটি স্টাডিছাড়াও ডাক্তারী পরীক্ষার উপরই নরিভও করে।

এমআরআই বশিল্ষেন (কনট্রাপটডাইসহ) ক্ষতেরে প্রদাহ ক্রিয়াকলাপেরে অতিরিক্ত পরতিরান সরবরাহ করে।

টকেনে টিয়াম কোন সনিটগিরাফী প্রারম্ভিকি রোগ নরিণয়ে সহায়ক কারন কলনিকিয়ালী নরিব সএনও ক্ষত প্রায়ই বদিযমান। যা হোক, পুরো শরীর এমআরআই ক্ষতেরে মাত্র নরিণয়ে বশে উপকারী।

উল্লেখ্যযে রোগ সংখ্যক রোগীর ক্ষতেরে শুধু ডায়াগনোসিসিকি ইমজেটি ম্যালগিন্যান্সি নিশিচিতি করতে পারে না এবং বায়োপসি প্রায়ই জন হয়। বশিষেত সএনও ক্ষত এবং ম্যালগিন্যান্সি অসুস্থি ক্ষতেরে মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠনি। বায়োপসি স্থান নরিণয়ে ফাংশনাল ও কসমটেকি দকিগুলে বিবেচনা যোগ্য। বায়োপসি শুধু রোগ নরিণয়েরে ক্ষতেরে করা উচতি এবং ডাক্তারেরে উচতি নর পুরো ক্ষত কটে ফলো, কারন এতে করে ফাংশনাল অসামর্য্য ও স্কারিং হতে

পারে। সপ্রিনও চকিৎসার ক্ষেত্রে ডায়াগনোস্টিক বায়োসিপি বাবরবার প্রশ্নবদিধ হয়ছে। সপ্রিনও রোগ আছে ধরা হয় যদি অস্থকিষত ৬ মাস বা তার বেশি থাকে এবং যদি রোগী বশেষিট্য়মূলক চরম কষত থাকে। এক্ষেত্রে বায়োসিপি পারহির যোগ্য তববে স্বেলপ ময়োধী কলনিকিযাল ফলে আপ ও আরকেবার ইমজেহি স্টাডী জরুরী। ম্যালগিন্য়নসীর সম্ভাবনা বাদ দিতে সম্পূরন একস্থানকি কষত যা অস্টিওমাইলাইটসিরে মত দেখায় এবং যা চারপাশরে টসিযুকবে আক্রান্ত করছে তা বায়োসিপি কিতবে হবে।

## ২.২ পরীক্ষার গুরুত্ব কতখানী ?

ক) রক্ত পরীক্ষা যমেনটা আগে উল্লেখ্য, সপ্রিনও/সআরএমও রোগ নরিনয়ে ল্য়াবরটেরী পরীক্ষা সুনরিদষিট নয়। পরীক্ষসমূহ যমেন-ইরাইথ্ররে সাইটিসিডেমিনেশন রটে (ইএসআর) সআরপি, হোল ব্লাড কাউন্ট, এলক্যালাইল ফসফাটজে এবং ক্রয়িটেনিনি রোগরে ব্যাথায়ুকত পর্যায়রে ক্ষেত্রে বশেষিট্য়মূলক বশেষেত প্রদাহরে মাত্রা এবং টতিযু আক্রান্ত নরিনয়ে ক্ষেত্রে। যাহোক এই পরীক্ষগুলে দয়িে প্রায়ই রোগ নগিয় করা যায় না। খ) প্রশ্রাব পরীক্ষা সিধান্ত মূলক নয়। গ) অস্থাবয়োসিপি একস্থানকি কষত এবং অনশিচয়তার ক্ষেত্রে জরুরী।

## ২.৩ এটা কী চকিৎসায় যোগ্য অথবা নরাময়যে যোগ্য ? চকিৎসাগুলে কী ?

প্রধানত নন স্টেরয়েডোল এনটিইনফলমেটেরী জাতীয় ঔষধ (এনএসএআইডি) যথা আইবিডিপ্রাদনে, ন্যাপরক্সনে, ইনডোমথোসনি দয়িে চকিৎসার দীর্ঘময়োধী উপাত্ত বদিযমান যখনে দেখো যায় কয়কে বছর করমাগত চকিৎসায় শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত রোগী রোগমুকত থাকে। যাহোক উল্লেখ্যযে যোগ্য সংখ্যক রোগীর নবিড়ি চকিৎসা প্রয়োগে জন স্টেরয়েডে ও সালফাসালায়নি দয়িে সম্প্রতিককালে ফসিফসনটে দয়িে ভাল ফল পাওয়া গছে। দীর্ঘময়োধী চকিৎসায় রোগ নরাময় না হওয়ার অবস্থত লিক্ষ্য করা গছে।

## ২.৪ ঔষধরে পারশ্রব প্রতিকরিয়ীগুলে কী ?

শশিুদরে কে দীর্ঘময়োধী চকিৎসা অবশ্যই নতিবে হবে তা মনে নেওয়া পতি মাতার কাছে সহজ নয়। ব্যাথা নাশক ও এনটিইনফ্রেমটেরী ঔষধরে পারশ্রব প্রতিকরিয়ায় তার উদবগিন। কিছু পারশ্রব প্রতিকরিয়ী যমেন পটেবে ব্যথা ছাড়া শশিুদরে ক্ষেত্রে এনএসএআইডি সাধারনত নরিপদ। বাড়তি তথ্যরে জন্য থরোপী অধ্যায় দেখুন।

## ২.৫ চকিৎসা কতদিন চলবে ?

চকিৎসার ময়োধি নরিভর করে স্থানীয় কষত, তাদের সংখ্যা ও তীব্রতার উপর সাধারনত বহু মাস ও বছর ধরে চকিৎসা প্রয়োগে জন।

## ২.৬ অপ্ৰচলতি অথবা পরপূরক চকিৎসাগুলে কী ?

অস্থাসন্ধরি প্রদাহরে ক্ষেত্রে ফজিকিযাল থরোপী দেওয়া যতে পারে। যাহোক পরপূরক চকিৎসার কোন উপাত্ত এ ক্ষেত্রে নাই।

---

২.৭ কী ধরনের ধারাবাহিক চকে আপ জরুরী ?

চকিৎসারও অবস্থায় বছরে দুইবার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করা উচিত।

২.৮ রোগটিকে কতদিন থাকবে ?

বশেষিভাগ ক্ষেত্রে রোগটিকে কয়েক বছর স্থায়ী হয় যদিও কিছু ক্ষেত্রে এটা সার জীবনের রোগ।

২.৯ রোগটির দীর্ঘময়াদি পরিনতি (সম্ভাব্য পরিনতিও ধারা) কী?

যদি যথাযথ চকিৎসা করা যায় তবে পরিনতি ভাল।

৩. প্রতদিনিকার জীবন।

৩.১ রোগটি শিশুর ও পরিবারের প্রতদিনিকার জীবন কভাবে প্রভাবিত করে?

শিশু এবং পরিবার রোগ নির্ণয়ের আগে প্রায়শই বহু মাস ধরে অস্থি ও অস্থিসিন্ধুরি ব্যথা ভোগ করে। পার্থক্য মূলক চকে আপ এর জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। রোগ নির্ণয়ের পর বরহিঃবিভাগ এ নিয়মিত ফলে আপ সুপারিশযোগ্য।

৩.২ বাচ্চা কিস্কুলে যাবে ? অথবা খলোধুলা করবে ?

খলোধুলা কক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। বশেষেত বায়ে আপসরি পর অথবা যদি অস্থিসিন্ধুরি প্রদাহ থাকে। তারপর সাধারণত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন হয় না।

৩.৩ কী খাবে ?

নির্দিষ্ট কোন পথ্য নেই।

৩.৪ জলবায়ু কী রোগের ধারা প্রভাবিত করে?

না, এটা তা পারেনা।

৩.৫ শিশুকে কী টীকা দেওয়া যাবে ?

টীকা দেওয়া যাবে, তবে কট্যকি ইস্ট্রিয়ডে, মথি ট্রিকিস্টে অথবা ট্রিনএফ আলদা ইনহিঃবিঃটির দিয়ে চকিৎসা চলাকালীন জীবনত ভ্যাকসনি দেওয়া যাবে না।

৩.৬ যখন জীবন, গরভাবস্থা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের কী হবে ?

---

সপ্রিনও রোগীদের বাচ্চা জন্মদানে কোন সমস্যা নেই। যদি প্লেভিক অস্থি আক্রান্ত হয় তাহলে যখন জীবন কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়। গর্ভাবস্থায় আগে এবং গর্ভাবস্থায় চিকিৎসার প্ৰয়োজনীয়ত পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যিক।