



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

দীর্ঘময়োদী অসংক্রমন অষ্টাওমাই লাইটসি/অষ্টারাইটসি (অথবা সআরএমও)

ববিরণ 2016

সআরএমও কী?

১.১ এটা কী?

দীর্ঘময়োদী পুনঃসংঘটিত রক্তস্থায়ী অষ্টাওমাইলাইটসি বশীর ভাগ সময়ই খুব মারাত্মক রকম দীর্ঘময়োদী আজীবন ঘটিত অষ্টাওমাইলাইটসি। শিশুরও কশিৎসারদরে ক্ষতেরে পুরদাহরে ক্ষত মূলত লম্বা অস্থিরি মটোফাইসিসিকে আক্রান্ত করে। যাহোক ক্ষত অস্থিরি যকোন জায়গায় হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য অঙ্গ, যমেন চমর, চক্ষু, পরিপিকতন্ত্র এবং অস্থি সন্ধি আক্রান্ত হতে পারে।

১.২ এর প্রাদুর্ভাব কমন ?

এই রোগেরে প্রাদুর্ভাব বিস্তারতি গবষেনা করা হয়নি। ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল রেজিস্ট্ররি তথ্য অনুযায়ী প্রায় দশ হাজারে মধ্যযে ১-৫ জন অধিবাসী আক্রান্ত হতে পারে। এতে কোন লঙ্গি প্রাদান্য নহে।

১.৩ রোগেরে কারনগুলো কী?

কারন অজানা, ধারণা করা হয় যে সহজাত ব্যবস্থার বশিঙ্খলার এই রোগটিরি যোগসূত্র থাকতে পারে। অস্থি বিপাকীয় কঙ্কি দুর্লভ রোগ সএনওর মত মনে হয়, যমেন হাইপোফসফাটশেয়া, কামুরাত এনজলেমেনে সনিড্রোম, বনোইন হাইপার অষ্টেসিসি প্যাকাইডামোরে অষ্টেসিসি এবং হসিটোসাইটেসিমি।

১.৪ এটা কী বংশগত ?

বংশগত প্রমানতি নয়, তবে ধারণা করা হয়, কঙ্কি সংখ্যক রোগীর ক্ষতেরে এটা বংশগত।

১.৫ আমার শিশুর এই রোগ কনে হয়েছে ? এটা কী প্রতরিতে ধযে যোগ্য ?

কারনগুলো এখনও অজানা। প্রতরিতে ধ ব্যবস্থাও অজানা।

১.৬ এটা কী ছুঁয়োচাে অথবা সংক্রামক ?

না, তা নং, সম্প্রতিক গবেষণায় কোন সংক্রামক বস্তু (যমেন ব্যাকটেরিয়া) পাওয়া যায় নাই।

১.৭ প্রধান উপসরগগুলিকী ?

রোগীরা সাধারণত অস্থি অথবা অস্থিসন্ধির ব্যাথা অভ্যিগ করে আর তাই পার্থক্য মূলক ডায়াগনোসিসের মধ্যযে আছে ডুভলাইল ইউপিঅ্যাফিকি আথরাইটসি এবং ব্যাকটেরিয়াল অতষ্টিওসাইলাইটসি। ডাক্তারী পরীক্ষায় বশেরিভাগ রোগীর ক্ষতেরে প্রধানত অস্থিসন্ধির প্রদাহ দেখা যায়। স্থানীয় অস্থি ফোলা এবং ব্যাথা সাধারণ এবং খুড়িয়ে চলা ও কার্যকারী দেখা যায়। এই রোগ দীর্ঘময়োদী ও পুনঃপুন সংঘটিতি হতে পারে।

১.৮ প্রতীশিশুর ক্ষতেরে রোগটিকি একই রকম ?

হা, প্রত্যেকে শিশুর ক্ষতেরে একই নয়। তার উপর আক্রান্ত অস্থিতির প্রকার, রোগের ময়োদ এবং উপসরগেরে তীব্রতা তারতম্য হয় এবং যদি পুনঃপুন সংঘটিতি হয় তাহলে একই শিশুর ক্ষতেরেও রোগেরে তারতম্য হতে পারে।

১.৯ বড়দরে রোগেরে থেকে শিশুদরে রোগ কী আলাদা ?

সাধারণত শিশুদরে সআরএমও বড়দরে মতই হয়। তবে রোগটির কিছু উপসরগ যমেন চ্য সেরিয়াসসি, পাসটুলার একনি) বশে আক্রান্ত হয়। বয়সতদরে ক্ষতেরে রোগটিকে এমএপিএইচও সনিড্রোম ডাকা হয় সাইনে ভাটিস, একনি, পাসটুলোসিস এবং অস্টিয়াইটসি। সআরএমওকে এসএপিএইচও সনিড্রোম এর শিশুও কশিার সংক্সরন হসিবে বিবেচনা করা হয়।

২. রোগ নরিণয় এবং চকিৎসা।

২.১ কভাবে রোগ নরিণয় করা হয় ?

সনিও/সআরএমও একটি বরজন ভিত্তিকি রোগ নরিণয়। গবেষণাগারেরে স্থতিমাপ দিয়ে সআর এমও/সএনও ধারণা করা যায় না। রডেওগরাফী দ্বারা সএনও অস্থিক্ষতেরে প্রারম্ভিক পরবিরতন ধরা পড়ে না যদিও রোগেরে পরবর্তী পরবর্তী ধাপে লম্বা অস্থি ও কলভেকিও অস্টিওপ্লাস্টিকি এবং স্কেরেটিকি পরবিরতন সএনও নরিদশেক। ভটবিরাল কমপ্রেশন পরবর্তী রডেওগরাফিকি চহিন, তবে অন্যান্য পাথক্যমূলক ডায়াগনোসিসি যমেন-ম্যালগিন্যান্সী ও অস্টিওপেরোসিসি বিবেচনা করতে হবে। সএনও রোগ নরিণয় তাই ইমজেটি স্টাডিছাড়াও ডাক্তারী পরীক্ষার উপরই নরিভও করে।

এমআরআই বিশ্লেষন (কনট্রাপটডাইসহ) ক্ষতেরে প্রদাহ ক্রিয়াকলাপেরে অতিরিক্ত পরতিরান সরবরাহ করে।

টকেনে টিয়াম কোন সনিটগিরাফী প্রারম্ভিকি রোগ নরিণয়ে সহায়ক কারন কলনিকিয়ালী নরিব সএনও ক্ষত প্রায়ই বদিযমান। যা হোক, পুরো শরীর এমআরআই ক্ষতেরে মাত্র নরিণয়ে বশে উপকারী।

উল্লেখ্যযে রোগ সংখ্যক রোগীর ক্ষতেরে শুধু ডায়াগনোসিটিকি ইমজেটি ম্যালগিন্যান্সি নিশিচিতি করতে পারে না এবং বায়োপসি প্রয়োজন হয়। বিশেষত সএনও ক্ষত এবং ম্যালগিন্যান্সি অস্থিক্ষতেরে মধ্যযে পার্থক্য করা খুবই কঠনি। বায়োপসি স্থান নরিণয়ে ফাংশনাল ও কসমটেকি দিকগুলে বিবেচনা যোগ্য। বায়োপসি শুধু রোগ নরিণয়েরে ক্ষতেরে করা উচতি এবং ডাক্তারেরে উচতি নর পুরো ক্ষত কটে ফলো, কারন এতে করে ফাংশনাল অসামর্য ও স্কারি হতে

পারে। সপ্রিনও চকিৎসার ক্ষেত্রে ডায়াগনোস্টিক বায়োসিপি বাবরবার প্রশ্নবদিধ হয়ছে। সপ্রিনও রোগ আছে ধরা হয় যদি অস্থিক্ষিত ৬ মাস বা তার বেশি থাকে এবং যদি রোগী বশেষিট্য়মূলক চর্ম ক্ষত থাকে। এক্ষেত্রে বায়োসিপি পারহির যোগ্য তববে স্বেলপ ময়োধী কলনিকিয়াল ফলে আপ ও আরকেবার ইমজেটি স্টাডী জরুরী। ম্যালগিন্যান্সীর সম্ভাবনা বাদ দিতে সম্পূর্ণ একস্থানকি ক্ষত যা অস্টিওমাইলাইটসিরে মত দেখায় এবং যা চারপাশের টিস্যুককে আক্রান্ত করছে তা বায়োসিপি করিতে হবে।

২.২ পরীক্ষার গুরুত্ব কতখানী ?

ক) রক্ত পরীক্ষা যমেনটা আগে উল্লেখ্য, সপ্রিনও/সআরএমও রোগ নরিনয়ে ল্যাবরটেরী পরীক্ষা সুনরিদষ্টি নয়। পরীক্ষসমূহ যমেন-ইরাইথ্রোসাইটিসিডেমিনেশন রটে (ইএসআর) সআরপি, হোল ব্লাড কাউন্ট, এলক্যালাইল ফসফাটেজ এবং ক্রিয়েটিনিনি রোগে ব্যাখায়ুকত পর্যায়রে ক্ষেত্রে বশেষিট্য়মূলক বশেষেত প্রদাহরে মাত্রা এবং টিস্যু আক্রান্ত নরিনয়ে ক্ষেত্রে। যাহোক এই পরীক্ষগুলে দিয়ৈ প্রায়ই রোগ নগিয় করা যায় না। খ) প্রশ্রাব পরীক্ষা সদিধান্ত মূলক নয়। গ) অস্থাবিয়ে সপি একস্থানকি ক্ষত এবং অনশিচয়তার ক্ষেত্রে জরুরী।

২.৩ এটা কী চকিৎসায়োগ্য অথবা নরাময়যোগ্য ? চকিৎসাগুলে কী ?

প্রধানত নন স্টেরয়েডোল এনটিইনফলমেটেরী জাতীয় ঔষধ (এনএসএআইডি) যথা আইবিডিপ্রাদনে, ন্যাপরক্সেনে, ইনডোমথোসানি দিয়ৈ চকিৎসার দীর্ঘময়োধী উপাত্ত বদিয়মান যখনে দেখো যায় কয়কে বছর করমাগত চকিৎসায় শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত রোগী রোগমুক্ত থাকে। যাহোক উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক রোগীর নবিড়ি চকিৎসা প্রয়োগে জন স্টেরয়েডে ও সালফাসালায়নি দিয়ৈ সম্প্রতিককালে ফসিফসনটে দিয়ৈ ভাল ফল পাওয়া গছে। দীর্ঘময়োধী চকিৎসায় রোগ নরাময় না হওয়ার অবস্থত লিক্ষ্য করা গছে।

২.৪ ঔষধরে পারশ্রব প্রতিকরিয়ীগুলে কী ?

শশিুদরে কে দীর্ঘময়োধী চকিৎসা অবশ্যই নতিবে তা মনে নেওয়া পতি মাতার কাছে সহজ নয়। ব্যাখা নাশক ও এনটিইনফ্রেমটেরী ঔষধরে পারশ্রব প্রতিকরিয়ায় তার উদবগিন। কিছু পারশ্রব প্রতিকরিয়ী যমেন পটেবে ব্যখা ছাড়া শশিুদরে ক্ষেত্রে এনএসএআইডি সাধারনত নরিপদ। বাড়তি তথ্যরে জন্য থরোপী অধ্যায় দেখুন।

২.৫ চকিৎসা কতদিন চলবে ?

চকিৎসার ময়োধি নরিভর করে স্থানীয় ক্ষত, তাদের সংখ্যা ও তীব্রতার উপর সাধারনত বহু মাস ও বছর ধরে চকিৎসা প্রয়োগে জন।

২.৬ অপ্ৰচলতি অথবা প্ৰপূরক চকিৎসাগুলে কী ?

অস্থি সন্ধরি প্রদাহরে ক্ষেত্রে ফজিকিয়াল থরোপী দেওয়া যতে পারে। যাহোক প্ৰপূরক চকিৎসার কোন উপাত্ত এ ক্ষেত্রে নাই।

২.৭ কী ধরনের ধারাবাহিক চকে আপ জরুরী ?

চকিৎসারও অবস্থায় বছরে দুইবার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করা উচিত।

২.৮ রোগটি কতদিন থাকবে ?

বশেষিভাগ ক্ষেত্রে রোগটি কয়েকে বছর স্থায়ী হয় যদিও কিছু ক্ষেত্রে এটা সার জীবনের রোগ।

২.৯ রোগটির দীর্ঘময়াদি পরিনতি (সম্ভাব্য পরিনতিও ধারা) কী?

যদি যথায়থ চকিৎসা করা যায় তবে পরিনতি ভাল।

৩. প্রতদিনিকার জীবন।

৩.১ রোগটি শিশুর ও পরিবারের প্রতদিনিকার জীবন কভাবে প্রভাবতি করে?

শিশু এবং পরিবার রোগ নরিণয়রে আগতে প্রায়শই বহু মাস ধরে অস্থি ও অস্থিসিন্ধরি ব্যথা ভোগ করে। পার্থক্য মূলক চকে আপ এর জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। রোগ নরিণয়রে পর বরহিঃবিভাগ এ নিয়মতি ফলে আপ সুপারশিয়েগ্য।

৩.২ বাচ্চা কিস্কুলে যাবে ? অথবা খলোধুলা করবে ?

খলোধুলা কক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। বশেষেত বায়ে আপসরি পর অথবা যদি অস্থিসিন্ধরি প্রদাহ থাকে। তারপর সাধারণত শারিরীক ক্রিয়াকলাপেরে সীমাবদ্ধতার প্রয়োগে জন হয় না।

৩.৩ কী খাবে ?

নরিদ্ষিট কোন পথ্য নহে।

৩.৪ জলবায়ু কী রোগেরে ধারা প্রভাবতি করে?

না, এটা তা পারেনা।

৩.৫ শশুক কী টীকা দেওয়া যাবে ?

টীকা দেওয়া যাবে, তবে কট্যকি ইস্ট্রিয়ডে, মথি ট্রিক্সটে অথবা ট্রিনএফ আলদা ইনহিঃবিঃটির দিয়ে চকিৎসা চলাকালীন জীবনত ভ্যাকসনি দেওয়া যাবে না।

৩.৬ যখন জীবন, গরভাবস্থা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণেরে কী হবে ?

সপ্রিনও রোগীদের বাচ্চা জন্মদানে কোন সমস্যা নেই। যদি প্লেভিক অস্থি আক্রান্ত হয় তাহলে যখন জীবন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থায় আগে এবং গর্ভাবস্থায় চিকিৎসার পরয়োজনীয়ত পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যিক।