



[www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro](http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro)

## পফিাপা

ববিরণ 2016

পফিাপা ক'?

ইহা ক'?

পফিাপা এর পরেইডকি ফভোর এ্যাডনোইটসি ফ্যারনিজাইটসি এ্যাপথেসিসি অরথ (Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis) এটা একটা মডেকিলে শব্দ যাত করে জ্বর, ঘাড়রে লসকি গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, গলায় ব্যাথা, মুখে ঘা, পফিাপা সাধারনত কম বয়সী শিশুদরে যা ৫ বছররে আগরে শিশুদরে হয়। রোগটা সাধারনত দীর্ঘময়োদী কনিতু কম ভয়াবহ যার সময়রে সাথে উন্নত হওয়ার প্রবনতা থাকে। রোগটা প্রথম চহিনতি হয় ১৯৪৭ সালে এবং মারসাল'স সনিড্রম (Marshall's syndrome) বলা হত।

ইহা কতটা সাধারন ?

রোগটা কতটা সাধারন তা জানা যায় নিকনিতু ধারনার চয়ে বশী হয়।

১.৩ এই রোগরে কারনগুলো ক'ক'?

এই রোগরে কারন জানা যায় নাই। জ্বররে সময় রোগ প্রতরিরোধ কষমতা সক্রয়ি হয়। এই সক্রয়িতা প্রদাহজনক প্রতিক্রয়িয়া দেখায় এবং গলায় ও মুখে প্রদাহ করে। এই প্রদাহ নজি নজি ভাল হয়ে যায় এবং দুইটা ঘটনার মাঝে প্রদাহরে কোন লক্ষণ থাকনো।

এটা ক'বংশগত ?

পারবারিকি কনিতু কোন জন্মগত কারন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এটা ক'সংক্রামক ?

এটা কোন সংক্রামক রোগ নয় এবং ছোয়াচোও নয়। তবে ইনফেকশন হয়তো আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

---

### ১.৬ প্রধান লক্ষণগুলো কীকি?

প্রধান লক্ষণগুলো হলো জ্বর, তার সাথে গলায় প্রদাহ, মুখে ঘা অথবা সারভাইকলে লসকিগ্নন্থি বড় হয়ে যাওয়া জ্বরের প্রকোপটা হঠাৎ করে শুরু হতে পারে এবং ৩ থেকে ৬ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এই সময় শিশুটি দিকেতে খুবই অসুস্থ মনে হয় এবং কমপক্ষে উপরে বর্ণিত ৩ টার মধ্যে ১টা লক্ষণ থাকতে পারে। জ্বরটা প্রতি ৩-৬ সপ্তাহ পরপর আসতে পারে কখনও কখনও খুবই নিয়মিত বর্তিতে আসতে পারে। জ্বরের মধ্যবর্তী সময়ে বাচ্চাটা ভাল থাকে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করে।

### এটা কিসব বাচ্চাদের একই হয় ?

উপরে বর্ণিত প্রধান উপসর্গগুলো আক্রান্ত সব শিশুদের পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু শিশুদের কিছু কম আকারে রোগটা হয় যখনে অন্য শিশুদের আরো কিছু বাড়তি উপসর্গ যমেন-অবম্বাদ, গীড়া ব্যথা, পটে ব্যথা মাথা ব্যথা বমি অথবা পাতলা পায়খানা হতে পারে।