



www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ক্যান্ডল

বিরণ 2016

রণে াগ নরণয় এবং চকিৎসা

এই রণে াগ কভাবে নরণয় সনাক্ত করা হয়?

প্রথমহে বাচচার লক্শন সমূহ দেখে ক্যান্ডল সম্পরকে ধারণা করা হয়। জনিগত বশিল্ষেন এর মাধ্যমহে কবেল ক্যান্ডল রণে াগটকি শনাক্ত করা যায়। ক্যান্ডল নশিচতিভাবে নরণয় হয় তখনই যখন দুটো জনিই মডিটে থাকে। জনিগত বশিল্ষেন সব তৃতীয় স্তরে সবা দান কারী নাও থাকতে পারে।

ককি গুবুত্বপূরণ পরীক্শা আছে?

রকত পরীক্শা যমেন-ই এস আর, সআরপি, রকত কণিকা সমূহের সংখ্যা, ফব্রিনি াজনে করা হয় রণে াগে প্রদাহের মাত্রা এবং রকত শূন্যতা দেখার জন্য। লভির আকরান্ত কনি দেখার জন্য লভির এর পরীক্শা করা হয়। পর্যায় ক্রমে এই পরীক্শাগুলে া বারবার করা হয়, যে গুলে া স্বাভাবিকি হয়ছে কনি বা স্বাভাবিকিরে কাছাকাছি এসছে কনি। জনেটেকি এনালাইসিসরে জন্য অল্প পরিমান রকতেরে দরকার হয়।

এটা ককি চকিৎসা পরতিকার করা সম্ভব?

ক্যান্ডল এর সম্পূরণ নরিাময় সম্ভব নয় কারণ এটা বংশগত/জনিগত

চকিৎসা ককি?

ক্যান্ডলে সনিড্রোম এর জন্য কোন কার্যকারী চকিৎসা নেই। উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েডে (১-২ মগিগ্ৰাঃ পরতিকর্জে ওজনরে জন্য পরতিকর্জি) ব্যবহারে কছি উপসর্গেরে উপসম হয় যমেন-চামড়ার দানা, জ্বর, গড়া ব্যাথা। কনিতু দানা মাত্রা কমানে া শুরু হয় তখনই উপসর্গ সমূহ কপিুনরায় ফরিে আসে। টপ্রিনএফ আলফা বাধা দানকারী ঔষধ এবং ওখ-১ (এনাকনিরা) ব্যবহারে কছি রণে াগীর ক্ষতেরে সাময়িকি উন্নতি গয়েছে অন্যদরে ক্ষতেরে বরং বড়েছে। টসলি াজুমাভ ব্যবহারে কছি উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্শমূলক ভাবে জ্যাক কাইনজে বাধা দানকারী ঔষধ টফসিটিনিডি ব্যবহারতি হয়ে চলছে।

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো ককি?

করটকি স্ট্রেয়েডেরে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনকে দীর্ঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবটসি হতে পারে।

করটকি স্ট্রেয়েডেরে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনকে র্দীঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবটসি হতে পারে।

কত দিন চকিৎসা করতে হবে?

চকিৎসা চলবে সারাজীবন

অগতানুগতকি বা পরস্পরক চকিৎসাগুলো ককি?

ক্যান্ডল সনিড্রোম এর ক্ষেত্রে এধরনরে কোন চকিৎসার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি।

কতদিন পরস্পর চকে-আপ করতে হবে?

এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে অসুখটিনিয়ন্ত্রনরে রাখার এবং ঔষধরে মাত্রা ঠকি রাখার জন্য নিয়মতি (বছওে কমপক্ষে ৩ বার) শিশু বারজ্বর বিশেষণরে কাছনে নিয়ে যতে হবে। বছওে অন্তত দুবার রক্ত ও প্রসাব পরীক্ষা করতে হবে।

কতদিন পরযন্ত এই রোগ থাকবে?

ক্যান্ডল একটা জীবনব্যাপী অসুখ। যাহোক, অসুখরে মাত্রা উঠা নামা করতে পারে।

দীর্ঘময়াদী পরনিতকি?

আয়ু কমে যতে পারে, বিভিন্ন অঙগরে প্রদাহরে ফল হিসেবে মৃত্যুও হতে পারে। যহেতে আক্রান্ত শিশুদরে শিশুদরে কর্মক্ষমতা কমে যায়। জ্বর, ব্যাথা এবং ঘনঘন মারাতক প্রদাহরে কারণে জীবনযাপনরে গুনগত মান কমে যায়।

সম্পূর্ণ নিরাময় কিসম্ভব?

না, সম্ভব নয়, কেননা এটা জনিগত রোগ