



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

সিস্টেমিক লউপাস ইরথিমোটোসিস

বিরণ 2016

৫। পরিশিষ্ট ২, নউন্যাটাল (নবজাতক)এর লউপাস

নউন্যাটাল লউপাস ভ্রুণ ও নবজাতককে একটি বিরল রোগ যা সুনরিদ্ষিট অটোএনটিবিডজিরে গরুভফুল হয়ে জরায়ু দিয়ে বসিত্তলাভ করে। নউন্যাটাল লউপাস এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুনরিদ্ষিট এনটিবিডগুলে এনটরিে ও এনটিলা এনটিবিডি হিসেবে পরচিতি। এই এনটিবিডগুলে এসএলইতে আক্রান্ত প্রায় এক তৃতীয়াংশ রোগীর মধ্যে দেখা যায়। তবে, এই এনটিবিডি রয়েছে এমন অনেকে মা নউন্যাটাল লউপাস রোগসহ সন্তান জন্ম দনে না। অপরপক্ষে, এসএলইতে আক্রান্ত নয় এমন প্রসূর্তিমার সন্তানে ও নউন্যাটাল লউপাস থাকতে পারে।

নউন্যাটাল লউপাস এসএলই থেকে ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নউন্যাটাল লউপাস ৩ থেকে ৬ মাস বয়সে এমনতিহে চলতে যায় এবং কোন প্রকার ছাপ বা প্রভাব রাখতে যায় না। সর্বাধিক প্রচলিত লক্ষণ হচ্ছে রুয়াশ (লাল লাল ফুসকুড়ি) যা জন্মের কয়েক দিন বা সপ্তাহ পর দেখা যায় বিশেষ করে সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকলে। নউন্যাটাল লউপাস এর রুয়াশ ক্রমস্থায়ী এবং কোন ক্ষত ছাড়াই সরে যায়। পরবর্তীতে লক্ষণটি বিশেষি দেখা যায় স্টেইচিছে অস্বাভাবিক রক্ত কনিকা কমে যাওয়ায়, যা খুব কম ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয় এবং কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সরে যায়।

খুব কম ক্ষেত্রে, জন্মগত হার্ট ব্লক নামে একটি বিশেষ রকমের হার্টবিটি সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা ঘটে। কনজনেটাল হার্ট ব্লকে, শিশুর শরীর গতিপালস হয় অস্বাভাবিকভাবে ধীর। এই অস্বাভাবিকতা স্থায়ী এবং ফটোল কার্ডিয়াক আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে গর্ভাবস্থার ১৫ থেকে ২৫ সপ্তাহের মধ্যে এটা ধরা পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অজাত শিশুর রোগ ও চিকিৎসা করা যায়। জর পর, কনজনেটাল হার্ট ব্লকে আক্রান্ত অনেকে শিশুর জন্ম পসেমকোর ঢুকানোর দরকার হয়। যদি কোন মার ইতে মাধ্যমে কনজনেটাল হার্ট ব্লকে আক্রান্ত একটি সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তার ১০% থেকে ১৫% বুকি থাকে যে, পরবর্তী শিশুও একই সমস্যা নিয়ে জন্ম হবে। নউন্যাটাল লউপাসে আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকই থাকে। তবে তাদের পরবর্তী জীবনে এসএলইতে আক্রান্ত হওয়ার ক্রম সম্ভাবনা থাকে।