



www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

হেনে এক সোলনে পারপুরা

ববিরণ 2016

হেনে এক সোলনে পারপুরা কি?

ইহা কি?

হেনে এক সোলনে পারপুরা এমন একটি অবস্থা যখনে ক্যাপিলারী নামক খুব ছোট রক্তনালী গুলে তে প্রদাহ হয়। এই প্রদাহকে ভাসকুলাইটিসি বলা হয় এবং সাধারণত চামড়া, অন্ত্র এবং কডিনীর ছোট রক্তনালীগুলে এতে আক্রান্ত হয়। এই প্রদাহকৃত রক্তনালীগুলে চামড়ার নীচে রক্ত রক্ষন করে গাঢ় লাল বা বগুনি রঙের ছোট ছোট দানা তৈরি করে যাকে পারপুরা বলা হয়। এরা অন্ত্র বা কডিনীতেও রক্ত রক্ষন করে যার ফলে রক্তমিশ্রিত পায়খানা বা পুরস্রাব (হমোচুরিয়া) হতে পারে।

এটা কত সচরাচর ঘটতে?

এইচ এস পি যদিও বাচ্চাদের একটি বিরল অসুখ, এটি ৫ থেকে ১৫ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ সিস্টেমিক ভাসকুলাইটিসি। এটা ছলেদের ময়েদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে (২:১)

এই রোগে কোন বিশেষ গণিতীয় বা ভৌগোলিক অবস্থার প্রত্যাঙ্কুল্য নেই। ইউরোপ এবং উত্তর গোলার্ধের বেশিরভাগ রোগ শীতকালে দেখা যায়, কিন্তু কিছু কিছু শরণ ও বসন্তকালেও দেখা যায়। এইচ এস পি তে প্রায় ১০০০০০ জনে ২০ জন প্রত্যি বছর আক্রান্ত হয়।

এই রোগের কারনগুলো কি কি?

এইচ এস পি এর কারন অজানা। সংক্রমনকারী জীবানু যমেন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে এই রোগের সূত্রপাতকারী মনে করা হয় কারন এটা মাঝে মাঝে উপররে শ্বাসনালীর সংক্রমনের পর হয়ে থাকে। তদুপরি, এই রোগটি বিভিন্ন ঔষধ, পোকাকার কামড়, ঠান্ডা, রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ এবং খাবারের কিছু আলার্জের থেকেও হতে পারে। এইচ এস পি জীবানু সংক্রমনের প্রতিক্রিয়া স্বল্পপও হতে পারে। (শিশুর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া) শরীরের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমেরে কিছু উপাদান যমেন ইমডিনে গুলে বিউলিন এ এইচ এস পি এর ক্ষততে জমা হওয়া থেকে মনে করা হয়ে যে, রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমে এর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া চামড়ার ছোট ছোট রক্তনালী, গরি, গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ট্রাক্ট/পর্যাপিকতন্ত্র, কডিনী এবং কখনও প্রধান যুতন্ত্র অথবা টেসেসিকে আক্রান্ত করে এবং রোগ তৈরি করে।

এটা কি বংশগত ? এটা কি ছট্টোয়াচে ? এটা কি পরিতরিতো ধ যোগ্য?

এইচ এস পিকোন বংশগত রোগ নয়। এটা ছট্টোয়াচে নয় এবং পরিতরিতো ধ যোগ্য নয়।

পরধান লক্ষণসমূহ কি কি?

পরধান লক্ষণ হচ্ছে বৈশিষ্টপূর্ণ চামড়ার লাল লাল মুখকুড়ি/দানা যা সব এইচ এস পরিবেশগতই থাকে। পরথমতে এগুলো ছোট লাল দাগ ও চুলকানি যুক্ত থাকে লাল প্যাচ বা ফোলা থাকে পরে বেগুনিকালো শরিতে পরবর্তিত হয়। এটাকে পালপবেল পারপুরা বলা হয়। কারণ চামড়ার উচ্চ অংশ অনুভব করা যায়। পারপুরা সাধারণত দুই পা ও নতিম্বে থাকে যদিও কিছু কিছু ক্বেত শরীরের অন্যান্য জায়গায়ও দেখা যায় যমেন দুই হাত ও শরীরের (উপররে ভাগ, অন্যান্য অংশ)।

বশেরিভাগ রোগীর ৬৫% ব্যথায়ুক্ত গড়ি অথবা ব্যথা এবং ফোলায়ুক্ত গড়ি (আথ্রাইটিস) সেই সাথে নড়াচড়ার সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত হাটু, গোড়ালী এবং কদাচি কবজি, কনুই এবং আঙুলে দেখা যায়। সেই সাথে গড়ি এবং গড়ির চারপাশে সফট টিস্যু ফুলে যায় এবং ব্যথা অনুভবিত হয়। হাত, পা, কপালে এবং অন্তর্কবেত থলরে ফোলাটা রোগরে পরথম দিকে হতে পারে, বশিষে করে খুব ছোট বাচ্চাদরে।

গড়ির লক্ষণগুলো অস্থায়ী এবং কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহরে মধ্যইে চলে যায়।

যখন রক্তনালীগুলোতে পরদাহ হয় ৬০ ভাগরে বশে ক্বেতরে পেটে ব্যথা হয় এটা থমে থমে আসে, নাভির চারপাশে হয় সেই সাথে অল্প থেকে পরচন্ড পরপিকতন্তরে অনেকে রক্তক্বেত হাতে পারে। কদাচি অন্তর অস্বাভাবিকভাবে ভাজ হয়ে যতে পারে, যাকে ইনটাসাসপশেন বলা হয়, যার ফলে অন্তরে পরতবিন্দতা সৃষ্টিত হয়, যার জন্য সার্জারী পরয়ে াজন হতে পারে।

কডিনী এর রক্তনালীতে পরদাহ হলে রক্ত ক্বেত হতে পারে (২০-৩৫% রোগীরে) এবং অল্প থেকে পরচন্ড হমুচুরিয়া (পরসাবে রক্ত) এবং পরে টনিুরিয়া (পরসাবে আমষি) হতে পারে। কডিনীর সমস্যা সাধারণত সাংঘাতিক হয়না। কদাচি মাস বা বছর পরযন্ত থাকতে পারে এবং কডিনী অকজে (১-৫%) হয়ে যতে পারে এসব ক্বেতরে কডিনী স্পশোলসিট নফেরে লে াজসিটদরে পরামরশ এবং রোগীর ডাক্তাররে সহযে াগতি পরয়ে াজন।

উপররে লক্ষণগুলো মাঝে মাঝে চামড়ায় ফুসকুড়ি/দানা হওয়ার কয়েকদিন াগে হতে পারে। এরা একই সময়ে অথবা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে হতে পারে।

অন্যান্য লক্ষণ যমেন খট্টনি, বরহৈন অথবা ফুসফুসে রক্ত ক্বেত ও অন্তর্কবেত ফোলা কদাচি হতে পারে এই আঙুলে ার রক্ত নালীতে পরদাহরে কারণে।

এই রোগটা কিসব বাচ্চার ক্বেতরে সমান ?

এই রোগটি কম বশে সিব বাচ্চার ক্বেতরে একই তবে বিভিন্ন রোগীর ক্বেতরে চামড়া এবং আঙুল আক্রান্তরে বসিতাররে দিক থেকে এটা তাৎপর্যাপন্নভাবে বিভিন্ন হতে পারে।

বাচ্চাদরে রোগটা কি বড়দরে রোগ থেকে ভিন ?

বাচ্চাদরে রোগটা বড়দরে থেকে ভিন নয়, কনিতু ছোট বাচ্চাদরে এটা কদাচি হয়।

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা।

কভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ?

এইচ এস পি এর রোগ নির্ণয় প্রাথমিকভাবে ক্লিনিক্যাল এবং ঐতিহ্যগতভাবে পারপ্যুরিক ইর্যাপশন এর এবং উপর ভিত্তি করে যা সাধারণত পা এবং নতিম্ব থাকে এবং এর সাথে কমপক্ষে একটা নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে পটে ব্যথা, গড়া আক্রান্ত হওয়া (আরথরাইটিস বা আরথ্রালভিয়ে) এবং কডিনী আক্রান্ত হওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হমোচুরিয়া। অন্যান্য রোগ যাত একই ধরনে লক্ষণ থাকে সেগুলো বাদ দিতে হবে। কদাচিৎ রোগ নির্ণয় জন্য চামড়া থেকে বায়োসী প্রয়োজন হতে পারে। হিস্টোলজীক্যাল পরীক্ষায় হমউনে গুলে বডিলাইন এ দেখার জন্য।

কি ক্লিনিক্যাল টেস্ট এবং অন্যান্য পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ?

এমন কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা নেই যা দিয়ে এইচ এস পি রোগ নির্ণয় করা যায়। ইয়াইথ্রোসাইট সডেমিনেটেশন রাইট (ই এসআর) অথবা সিরিকিউলি প্রোটিন (সিআর পি, সিস্টেমিক প্রদাহের পরিমাপ) স্বাভাবিক বা বেশি হতে পারে। পায়খানায় সুপ্ত রক্ত কষুদ্রান্তরে রক্তক্ষরণ নির্দেশ করতে পারে। প্রসাব পরীক্ষা করে রোগ চলাকালীন সময়ে কডিনীর সমস্যা নির্ণয় করা উচিত। লোগ্রাডে হমোচুরিয়া সচরাচর থাকে যা সময়ে ঠিক হয়ে যায়। যদি কডিনী সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয় স্বল্প মাত্রায় টেস্ট, রনোল ইনসারফসিয়েনসি বা তাৎপর্যপূর্ণ পরোটিনুরিয়া) তবে কডিনী বায়োসী প্রয়োজন হতে পারে। ইমজিৎ যমেন আলট্রাসাউন্ড করা যতে পারে পটে ব্যথার অন্যান্য কারণ বাদ দেওয়া এবং সম্ভাব্য জটিলতা যমেন অন্তরে পরতবিন্দুকতা নির্ণয় করার জন্য।

এটা কি চিকিৎসায়োগ্য?

বেশিরভাগ এইচ এস পি রোগী ভালো থাকে এবং আদট কোন চিকিৎসার দরকার হয়না। এর ফলে যখন রোগে লক্ষণ থাকে বাচারা বশিরাম দিতে পারে। চিকিৎসা যখন প্রয়োজন প্রধানত সহায়ক, যমেন ব্যথায়ুক্ত করা সাধারণ অ্যানালজসেকি (ব্যথানাশক) যমেন এসটিমিনেফনে অথবা নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফলামটেরী ঔষধ দিয়ে যমেন ইবুপ্রোফেনি বা নপেরোকসনে যখন গড়ার সমস্যাগুলে প্রধান থাকে। মুখে বা শরীর মাধ্যমে করটিকোস্টেরয়েডে দিতে হবে যদি রোগী তীব্র পাকস্থলী অন্তরনালীর লক্ষণ বা রক্তক্ষরণ এবং কদাচিৎ অন্যান্য অঙ্গ (যমেন অন্তকেষে) তীব্র সমস্যা থাকে। যদি কডিনীর সমস্যা তীব্র হয় অবশ্যই কডিনী বায়োসী করতে হবে এবং যাদ ইনডিকটেডে হয় করটিকোস্টেরয়েডে এবং ইমউনেসাপ্রসেভি ঔষধ দিয়ে সমন্বতি চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

ঔষধে পার্শ্ব পরতিক্রিয়া গুলে কি কি?

এইচ এস পি এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বা অল্প সময়ের জন্য ঔষধ দয়ো লাগতে পারে। তাই কোন বড় ধরনে পার্শ্ব পরতিক্রিয়া আশা করা যায়না। কদাচিৎ, প্রচন্ড কডিনী সমস্যায় প্রডেনসিালন এবং ইমউনেসাপ্রসেভি ঔষধ ব্যবহার করা হলে দীর্ঘ সময় ধরে, তখন ঔষধে পার্শ্ব পরতিক্রিয়ার সমস্যা হতে পারে।

রোগটা কতদিন থাকে ?

রোগের পুরো কোর্স প্রায় ৪-৬ সপ্তাহ। অর্ধেকের বেশি বাচ্চাদের ৬ সপ্তাহের মধ্যে কমপক্ষে একবার পুনরায় হতে পারে, যটা সাধারণত অল্প সময় এবং অল্পমাত্রায় থাকে প্রথমবারের চেয়ে পুনরায় হলেও কদাচিৎ বেশী সময় ধরে থাকে। পুনরায় রোগ দেখা দিলেই সটা তীব্রতা নির্দেশে করনো। বেশিভাগ রোগী পুরো পুরি সুস্থ হয়ে যায়।

দৈনন্দিন জীবন

রোগটি বাচ্চা এবং তার পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলে এবং কি ধরনের পর্যাৱত্ত পরীক্ষা করা জরুরী ?

বেশিভাগ বাচ্চাদের রোগটি নজিে নজিেই ভালো হয়ে যায় এবং কোন দীর্ঘ ময়োদসিমস্যা করনো। অল্প শতাংশ রোগী যাদের অনড় এবং তীব্র কডিনী রোগ থাকে তাদের ক্ষেত্রে এ প্রগতশীল কোর্স থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য কডিনী ফেইলর/বকিল হতে পারে। সাধারণত বাচ্চা এবং পরিবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

রোগ চলাকালীন সময়ে কয়েকবার প্রসাব পরীক্ষা করা উচিত এবং ৬ মাস পরেও করতে হবে রোগটি ভালো হয়ে যাবার। এটা সম্ভাব্য কডিনীসিমস্যা নির্নয় করার জন্য যহেতু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি শুরু হওয়ার কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ পরে, কডিনী আক্রান্ত হতে পারে।

বাচ্চা কিস্কুলে যতে পারবে ?

একডিট/হঠাৎ রোগের সময় সব ধরনের শারীরিক কার্যকলাপ কমিয়ে দিতে হবে এবং এসময় বিশ্রাম প্রয়োজন। সুস্থ হবার পর বাচ্চা আবার স্কুলে যতে পারবে এবং অন্যান্য সুস্থ সমকক্ষদের মত সকল কার্যকলাপ অংশ গ্রহনসহ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। বাচ্চাদের জন্য স্কুলে এবং বড়দের জন্য কাজ সমার্থক, এটা এমন জায়গা যখনে তারা শখিতে পারে কডিবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ফলপ্রসু মানুষ হওয়া যায়।

খলোধুলার বিষয়ে করনীয় কি ?

সকল কার্যকলাপই করতে পারবে যতদূর প্রযনত সহ্য করা যায় সজন্য সাধারণ পরামর্শ হল রোগীদেরকে খলোধুলায় অংশ গ্রহন করতে দেয়া এবং এটা বিশ্বাস করা যে যদি গড়ায় আঘাত হয়, তারা খলো বন্ধ করে দিবে সেই সাথে খলোধুলার শক্ষিক খলোজনতি আঘাত পরতিরোধ করার পরামর্শ দেয়া, বিশেষ করে কশিরে বয়সে। যদিও যান্ত্রিক চাপ প্রদাহ জনতি গড়ার জন্য অপকারী এটা মনে করা হয় যে, রোগের কারণে বন্ধুদের সাথে খলো থকে বরিত রাখলে বাচ্চার যে মানসিক ক্ষতি হবে, তার তুলনায় এই শারীরিক ক্ষতি অনেক সামান্য।

খাদ্য বিষয়ক উপদশে কি ?

এমন কোন সাক্ষা প্রমান নেই যে, খাবারের মাধ্যমে রোগটি প্রভাবিত হতে পারে। সাধারণভাবে বাচ্চা তার বয়স অনুযায়ী সুস্থ স্বাভাবিক খাবার খাবে। বাড়ন্ত শিশুর জন্য স্বাস্থ্যপদ, সুস্থ খাবারের সাথে আমষি, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। যসেব রোগীরা করটিকে স্ট্রেয়েডে পাবে তাদের অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এই ঔষধগুলো কষুধা বাড়িয়ে দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে উপর প্রভাব ফেলতে পারে ?

এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যে জলবায়ু পরিবর্তনে উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বাচ্চাকে কি ভ্যাকসিন /টিকাদানো যাবে ?

ভ্যাকসিনেশন/টিকা দানো স্থগিত রাখতে হবে এবং শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী বাদ পড়া টিকার সময় নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণভাবে টিকাদান পরিবর্তন কার্যকলাপ/একটিভিটি বাড়ায় না বা পরিবারের পরিবেশে ক্রমে তীব্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া করনো। তদুপরি লাইভ এটেনুয়েটেড ভ্যাকসিনগুলো এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তৎবর্তমানে বলা হয় যে, যসেব পরিবেশ উচ্চমাত্রায় ইমউনোসাপ্রসেসিভ ঔষধ বা বায়োলজিকস পাচ্ছে তাদের ক্রমে ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি আছে।

যেই জীবন, গর্ভাবস্থা, জন্মনয়ন্ত্রন বিষয়ক পরামর্শ কি ?

এই পরিবেশে স্বাভাবিক যেই কারণ এবং গর্ভাবস্থায় উপর কোন বাধানিধে নেই। তদুপরি যসেব পরিবেশ ঔষধ খাচ্ছে তাদেরকে ভ্রূণের উপর এসব ঔষধের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। পরিবেশেরকে জন্ম নিরোধক এবং গর্ভাবস্থার ব্যাপারে তাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ন্যায় উপদেশে দানো হয়ে থাকে।