



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/CZ/intro>

## Terapie

Verze č 2016

### 2. Cyklosporin A

#### 2.1 Popis

Cyklosporin A je lék potlačující imunitu, který byl původně používán u pacientů, kteří podstoupili transplantaci orgánu. Je však používán i v léčbě dětských revmatických onemocnění. Jedná se o účinný inhibitor funkce jednoho typu bílých krvinek, které hrají zásadní roli v imunitní odpovědi.

#### 2.2 Dávkování/způsoby podávání

Může být podáván jako roztok nebo tablety v dávkování 3-5 mg/kg a den ve dvou denních dávkách.

#### 2.3 Vedlejší účinky

Vedlejší účinky jsou poměrně časté, především u vysokých dávek, a mohou omezovat použití léku. Zahrnují poškození ledvin, vysoký krevní tlak, poškození jater, zbytnění dásní, zmnožení chlupů po těle, nevolnost a zvracení.

Léčba cyklosporinem vyžaduje pravidelné klinické a laboratorní kontroly k posouzení vedlejších účinků léčby. Dětem je třeba pravidelně doma kontrolovat krevní tlak.

#### 2.4 Hlavní dětské revmatologické indikace

Syndrom aktivace makrofágů

---

## Juvenilní dermatomyozitida