



paediatric  
rheumatology  
european  
society



SHARE



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/DZ/intro>

## العلاج بالأدوية

نسخة من 2016

### 12- الميكوفينولات موفيتيل

#### 1-12 الوصف

في بعض أمراض الأطفال الروماتيزمية يكون جزء من الجهاز المناعي مفرط النشاط. يُبَطِّن الميكوفينولات موفيتيل انتشار الخلايا اللمفاوية البائية والتأئية (وهي عبارة عن خلايا دم بيضاء معينة)؛ أو بعبارة أخرى، يُقلل من معدل تكوُّن بعض خلايا المناعة النشطة، وبالتالي ترجع فعالية الميكوفينولات موفيتيل إلى هذا التثبيط والتي تبدأ بعد بضعة أسابيع.

#### 2-12 الجرعة/طرق التناول

يمكن إعطاء الدواء في صورة أقراص أو مسحوق لعمل محلول من حرام واحد إلى 3 غرام يومياً. وينصح بتناول الميكوفينولات موفيتيل بين الوجبات، حيث قد يُقلل تناول الطعام من امتصاص هذه المادة، وفي حالة فوات موعد تناول إحدى الجرعات، يجب على المريض ألا يتناول جرعة مزدوجة في المرة التالية. يجب تخزين المنتج في عبوته الأصلية مع غلقه بإحكام. ومن الناحية المثالية، يلزم تحديد تركيزات الدواء من خلال تحليل عينات دم عديدة تُؤخذ في نفس اليوم ولكن في أوقات مختلفة؛ حيث يُتيح ذلك ضبط الجرعة المناسبة لكل مريض على حدة.

#### 3-12 الآثار الجانبية

يتمثل الأثر الجانبي الأكثر شيوعاً لهذا الدواء في اضطراب الجهاز الهضمي، ويلاحظ ذلك في نسبة 10-30% من الحالات خاصة في بداية العلاج، كما قد يكون هناك إسهال أو شعور بالغثيان أو قيء أو إمساك، وإذا استمرت هذه الأعراض في الظهور، قد يتم تناول جرعة مخفضة أو قد يُنظر في التحويل إلى تناول منتج مماثل (مايفورتك)، وقد يؤدي هذا الدواء إلى انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء وأو الصفائح الدموية؛ وبالتالي يجب مراقبة ذلك بصفة شهرية، ويلزم وقف إعطاء الدواء بشكل مؤقت في حالة انخفاض خلايا الدم البيضاء وأو الصفائح الدموية.

يمكن أن يتسبب المرض في ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى، كما يمكن أن تؤدي الأدوية

---

المبطة للجهاز المناعي إلى استجابة غير طبيعية للقاولات الحية، لذا يُنصح بعدم تلقي طفلك للقاولات الحية مثل لقاح الحصبة، ويوصى باستشارة الطبيب قبل تلقي التطعيمات والسفر للخارج. يجب تحبب الحمل أثناء العلاج باستخدام الميكوفينولات موفيتيل. وتعد الفحوصات السريرية الروتينية (شهرياً) وضوابط الدم والبول ضرورية للكشف عن الآثار الجانبية المحتملة والتعامل معها.

#### **4-12 دواعي الاستعمال الرئيسية للأمراض الروماتيزمية في الأطفال**

**الذئبة الحمامية المجموعية لدى الأطفال**