

## درمان دارویی

نسخه 2016

### 2. سیکلوسپورین A

#### 1.2 تعریف و شناخت

سیکلوسپورین A یک داروی سرکوب کننده ایمنی است، در ابتدا برای پیشگیری از پس-زدن پیوند در بیماران تحت جراحی پیوند عضو استفاده می-شد، اما در حال حاضر برای بیماری-های روماتیسمی کودکان استفاده می-شود. این دارو یک ممانعت کننده بالقوه برای گروهی از گلبولهای سفید است که در سرکوب ایمنی نقش دارند.

#### 2.2 میزان / روش مصرف دارو

این دارو می-تواند به شکل قرص یا مایع مورد استفاده قرار بگیرد در دوز 3-5 روز در مرتبه دو mg/kg/day

#### 3.2 اثرات جانبی

اثرات جانبی نسبتاً شایع هستند، بویژه در دوزهای بالا و ممکن است استفاده از دارو را محدود کنند. این اثرات شامل آسیب-کلیوی، فشارخون بالا، آسیب-کبدی، بزرگی لته، رشد مو روی بدن، تهوع و استفراغ هستند. بنابراین این دارو با سیکلوسپورین نیاز به بررسی منظم آزمایشگاهی و بالینی برای پیگیری اثرات جانبی دارد. فشار خون این بچه-ها باید بطور منظم در منزل چک شود.

#### 4.2 اندیکاسیون-های اصلی تجویز دارودر بیماری-های روماتیسمی کودکان سندرم فعال شدن ماکروفاژ

درماتومیوزیت جوانان