



[www.printo.it/pediatric-rheumatology/KR/intro](http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/KR/intro)

?

, ' , 16 . ' , .

?

, , 가

가 ?

10 80 90 .

가 ?

( ) ,

가

, , 가 ,

' 가 ' , , 가

가 ?

가 ( ) 가 ,

( ) 가

가 가

?

16

, 6 ) ,

(

6

가 , ' ,

?

가

( 가 ) .

( ) ( )

가

가

가

?

가 가

6

( ) , ( )

( 가 )

10%

: 6 5

가 가

가

1)

( 5% ) , (

, 10

가



가 ?

70%

50% 5%

가 가 ?

가

(Rheumatoid factor: RF)

(Anticuclear antibody: ANA)

가

3

HLA-B27

80%

(ESR) C

(58%).  
(CRP)

가

가

가

?

가

1)

( )

(naproxen)

(ibuprofen)

가

가

가

가

가

가

가

---

2) 가 (Triamcinolone hexacetonide)

3) 2 가 2 (methotrexate) 1

(transaminase, 가 ) 가가 가 가

(Salazopyrine) 가

(leflunomide) (cyclosporine) 가 (steroid-resistant

macrophage activation syndrome)

(anti-TNF drug)

가 가 가 가 가 2

4) , 2 가 ( )

5) ,

6) 가 ,

---

가 ?

가

가

(

)

가

가

,

.

,

가

.

(folinic folic acid)

가

가

(hypertransaminasemia, ),

(

가

가

)

,

(anti-TNF agent)

가

가

가

?

.

.

( , Slit lamp examination)

(

가

)

3

?

,

,

( , , )

(

)

가 ?

가,

가

10

가

가

가

가

가

---

가 , 가 가

가 .  
1/4

가  
가  
가

가 ?  
( )

가 ?  
가 ( , (MMR, Sabin ) , BCG )  
DTP, Salk , B , ) ( :

가 ? 가  
가 가 , 가

가 가 ?

?

가

