



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/LT/intro>

Medikamentinis Gydymas

Versija 2016

2. CIKLOSPORINAS A

2.1. Apibūdinimas

Ciklosporinas A yra imunitetą slopinantis vaistas, kuris pirmiausia buvo skiriamas pacientams po transplantacijos operacijų – atmetimo rizikai sumažinti. Šiuo metu jis naudojamas ir reumatinėms ligoms gydyti. Ciklosporinas A slopina tam tikrą grupę baltųjų kraujo kūnelių, kurie vaidina svarbiausią vaidmenį imuniniame atsake.

2.2. Dozavimas / skyrimo būdai

Gali būti skiriamas skystas arba tabletėmis 3–5 mg/kg per dieną, dalijant į 2 dozes.

2.3. Šalutinis poveikis

Nepageidaujamas poveikis gana dažnas, ypač gydant didelėmis dozėmis, todėl vaisto vartojimą gali tekti riboti. Gali pažeisti inkstus, kepenis, padidinti kraujospūdį, kūno plaukuotumą, sukelti dantenų tinimą, pykinimą, vėmimą.

Gydantis ciklosporinu reikia reguliariai lankytis pas gydytoją, tikrintis kraujo rodiklius, siekiant įvertinti vaisto šalutinį poveikį. Vaikams būtina nuolat namuose matuoti kraujo spaudimą.

2.4. Pagrindinės vaikų reumatinių ligų indikacijos

Makrofagų aktyvacijos sindromas

Jaunatvinis dermatomiozitas