

العلاج بالأدوية

نسخة من

9- الهيدروكسيكلوروكوين

1-9 الوصف

كان الهيدروكسيكلوروكوين يُستخدم في الأساس لعلاج مرض الملاريا، ثم ظهر للدواء استخدامات أخرى في العديد من العمليات المرتبطة بالالتهابات.

2-9 الجرعة/طرق التناول

يُعطى الدواء مرة واحدة يومياً على هيئة أقراص حتى 7 ملجم لكل كجم في اليوم أثناء تناول الوجبات أو مع كوب من الحليب.

3-9 الآثار الجانبية

يتقبل الجسم دواء الهيدروكسيكلوروكوين بشكل جيد، وقد تقع حالات من عدم تحمل المعدة له، متمثلة بشكل رئيسي في الغثيان، إلا إنها غير شديدة. والتأثير الأهم له هو سمية العين، فالهيدروكسيكلوروكوين يتراكم في جزء من العين يُسمى بالشبكية ويظل بها لفترات طويلة بعد الانقطاع عن استخدامه.

والتغيرات الحادثة نتيجة لذلك نادرة، إلا أنها قد تتسبب في الإصابة بالعمى حتى بعد توقف تناول الدواء. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر هذه الاضطرابات التي تطرأ بالعين نادرة الحدوث بشكل كبير عند تناول الدواء بجرعات قليلة كما هو الحال حالياً.

يعمل الكشف المبكر لهذه المضاعفات على الوقاية من فقدان البصر وحتى في حال الانقطاع عن تناول الدواء؛ يوجه المريض لإجراء فحوصات دورية للعين عند إعطاء الهيدروكسيكلوروكوين بجرعات قليلة، كما هو الحال مع الأمراض الروماتيزمية.

4-9 دواعي الاستعمال الرئيسية للأمراض الروماتيزمية في الأطفال

التهاب الجلد والعضلات لدى الأطفال
الذئبة الحمراء.

