



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/PT/intro>

## **Terapia medicamentosa**

Versão de 2016

### **2. Ciclosporina A**

#### **2.1 Descrição**

A ciclosporina A é um medicamento imunossupressor, inicialmente utilizado para prevenir a rejeição de órgãos em doentes submetidos a transplantes, mas atualmente também é utilizado em doenças reumáticas pediátricas. É um potente inibidor de um grupo de glóbulos brancos que tem um papel fundamental na resposta imunitária.

#### **2.2 Dosagem/modos de administração**

Pode ser administrado sob a forma de líquido ou comprimido numa dosagem de 3-5 mg/Kg/ dia em 2 doses.

#### **2.3 Efeitos secundários**

Os efeitos secundários são bastante frequentes, especialmente em doses elevadas e podem limitar a utilização do medicamento. Incluem lesões renais, hipertensão arterial, lesões hepáticas, aumento das gengivas, crescimento de pelos no corpo, náuseas e vômitos. Como tal, o tratamento com ciclosporina requer, check-ups clínicos e laboratoriais periódicos para poder avaliar os efeitos secundários do medicamento. A tensão arterial das crianças deve ser verificada periodicamente em casa.

#### **2.4 Principais indicações em doenças reumáticas pediátricas**

Síndrome de ativação macrofágica.

---

Dermatomyosite juvenil.