www.printo.it/pediatric-rheumatology/RO/intro

Vasculite Primare Sistemice Juvenile Rare

Versiunea 2016

8. ALTE VASCULITE ȘI CONDIȚII SIMILARE

Vasculita cutanată leucocitoclastică (cunoscută şi ca vasculita alergică sau de hipersensibilitate) presupune o inflamaţie a vaselor sanguine cauzată de o reacţie neadecvată la un agent sensibilizant. Medicamentele şi infecţiile sunt factorii care declanşează de obicei această boală la copii. Boala afectează cel mai frecvent vasele mici şi are un aspect microscopic specific pe biopsia din piele.

Vasculita urticariană hipo-complementemică este caracterizată de o erupţie cutanată extinsă, asemănătoare urticariei, acompaniată frecvent de mâncărime, care nu dispare la fel de rapid ca reacţiile alergice obişnuite. Această afecțiune prezintă nivele scăzute de complement detectate la testele sanguine.

Poliangiita eozinofilică (PAE, denumită anterior sindromul Churg-Strauss) este un tip extrem de rar de vasculită la copii. Diverse simptome de vasculită la nivelul pielii şi organelor interne sunt însoţite de astm bronşic şi de creşterea (în sânge și în țesuturi) a numărului unui tip de globule albe numite eozinofile.

Sindromul Cogan este o boală rară caracterizată de afectarea ochilor şi urechii interne, manifestată prin fotofobie, ameţeală şi pierderea auzului. Pot fi prezente şi simptome cauzate de o extindere mai mare a vasculitei.

Boala Behcet a fost discutată separat într-o altă secțiune.