



www.printo.it/pediatric-rheumatology/RU/intro

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Версия 2016

8. Лефлуноמיד

8.1 Описание

Лефлуноמיד является альтернативой для пациентов, у которых метотрексат не эффективен или которые его не переносят. Однако опыт применения этого препарата у детей, артритом, по-прежнему ограничен, и препарат не одобрен регулирующими органами для применения при ЮИА.

8.2 Дозировка/способы введения

Дети с массой тела менее 20 кг получают 100 мг лефлуномида перорально в один день, после чего – поддерживающую дозу 10 мг через день. Дети с массой тела от 20 до 40 кг получают 100 мг лефлуномида в течение двух дней, после чего – поддерживающую дозу 10 мг в день. Дети с массой тела более 40 кг получают 100 мг лефлуномида в течение трех дней, после чего – поддерживающую дозу 20 мг в день.

Поскольку лефлуноמיד обладает тератогенным эффектом (может вызвать пороки развития у плода), молодые женщины, обладающие детородным потенциалом, должны иметь отрицательный результат теста на беременность перед началом приема этого лекарства и обязаны применять соответствующие средства контрацепции.

8.3 Побочные эффекты

Основными побочными эффектами являются диарея, тошнота,

рвота. В случае токсичности необходимо лечение холестирамином под наблюдением врача.

8.4 Основные показания для лечения ревматических заболеваний у детей

Ювенильный идиопатический артрит (препарат не одобрен для применения при ювенильном идиопатическом артрите).