



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/TH/intro>

การรักษาโดยการฉายยา

ฉบับแปลของ 2016

9. ไฮดรอกซีคลอโรควิน

9.1 คุณลักษณะของยา

แต่เดิมยาไฮดรอกซีคลอโรควินถูกใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย ปัจจุบันนี้ยานี้สามารถนำมาใช้ต้านกระบวนการอักเสบได้

9.2 ปริมาณและวิธีการฉายยา

เป็นรูปแบบยาเม็ดให้แค่หนึ่งครั้งต่อวัน โดยขนาดได้มากถึง 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน กินพร้อมอาหารหรือนม

9.3 ผลข้างเคียงของยา

ผู้ป่วยมักทนต่อยาไฮดรอกซีคลอโรควินได้ดี อย่างไรก็ตามพบผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ได้บ้างแต่ไม่รุนแรง สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดคือผลเสียต่อตา

โดยยานี้จะไปสะสมที่จอประสาทตาที่เรียกว่า เรตินา ซึ่งคงอยู่ได้เป็นระยะเวลานานหลังจากที่หยุดฉายยาแล้ว

อาการทางตาพบได้น้อยมาก แต่อาจรุนแรงถึงภาวะตาบอดแม้จะหยุดการฉายยานี้ไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามไม่ควรกังวลมากเกินไปเมื่อต้องฉายยาไฮดรอกซีคลอโรควิน

เพราะปัญหาทางตาแทบจะไม่พบเลยหากฉายยาในขนาดต่ำแบบนี้

การตรวจตาเป็นระยะเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น โดยควรรีบหยุดยาให้เร็วที่สุด แม้ว่า ณ ขณะนี้ยังมีข้อโต้แย้งถึงความถี่ในการตรวจตาหากฉายยาไฮดรอกซีคลอโรควินขนาดต่ำ

ดังในผู้ป่วยโรคทางรูมาติก

9.4 ข้อบ่งชี้หลักของยานี้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (โรคทางรูมาติก)

โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบในเด็ก

โรคเอสแอลอี/โรคภูบ่สในเด็ก