



1.5 痛風性關節炎

痛風性關節炎是由尿酸鹽沉積在關節中引起的炎症。它通常會導致關節紅腫、疼痛和發熱。痛風性關節炎最常影響大腳趾，但也可能影響其他關節。痛風性關節炎是由尿酸鹽沉積在關節中引起的炎症。它通常會導致關節紅腫、疼痛和發熱。痛風性關節炎最常影響大腳趾，但也可能影響其他關節。

1.6 骨質增生

骨質增生是由於關節退行性變而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。骨質增生最常影響頸椎和腰椎，但也可能影響其他關節。骨質增生是由於關節退行性變而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。骨質增生最常影響頸椎和腰椎，但也可能影響其他關節。

1.7 關節炎

關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。

關節炎

關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。

關節炎

關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。

關節炎

關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。

關節炎

關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。關節炎是由於關節軟骨退化而發生的。它通常會導致關節疼痛、僵硬和活動受限。關節炎最常影響膝關節和髋關節，但也可能影響其他關節。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.8

 "_____"

1.9

25 3 80% 5-19

2. □□□□□

2.1 背景

[illegible]

2.2 实验环境

"[REDACTED]" [REDACTED]
[REDACTED] 6 [REDACTED]
[REDACTED]

2.3

ASO-DNase B

2.4

XX
XXX
XX
XX

2.5 数据/时间

[illegible]

2.6 实验结果

[illegible]

2.7

[illegible]

2.8

3-5
 5
 21
 10
 21
 10
 40
 10
 21

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]

PSRA ARF PSRA

□ □