



10-2-4 Legg-Calve-Perthes

Legg-Calve-Perthes 症候群は、小児の股関節に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

10-2-5 Legg-Calve-Perthes

Legg-Calvé-Perthes 症候群は、小児の股関節に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。この疾患は、股関節の骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

10-2-6 Legg-Calve-Perthes

Legg-Calve-Perthes 症候群は、小児の股関節に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。6歳未満の小児に発生する疾患で、2/3の小児が回復します。

10-2-7 Legg-Calve-Perthes

Legg-Calve-Perthes 症候群は、小児の股関節に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

10-3 Legg-Calvé-Perthes

Legg-Calvé-Perthes 症候群は、小児の股関節に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。1%の小児に発生する疾患で、X線検査で股関節の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

10-4 Sever's

Sever's 症候群は、小児の踵骨に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で踵骨の骨の壊死と再生の過程を確認できます。7-10歳の小児に発生する疾患で、X線検査で踵骨の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

10-5 Freiberg's

Freiberg's 症候群は、小児の第2中足骨に発生する骨の壊死と再生の過程を特徴とする疾患です。X線検査で第2中足骨の骨の壊死と再生の過程を確認できます。2歳未満の小児に発生する疾患で、X線検査で第2中足骨の骨の壊死と再生の過程を確認できます。

1

10.6 Scheuermann's

Scheuermann's