https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro
藥物治療
第？版本
 3. 靜脈輸注免疫球蛋白（IVIG）
 3.1概述
免疫球蛋白與抗體是同義詞。靜脈用免疫球蛋白（IVIG）是來自大量健康供血者的血漿，血漿是人血的液體成分。IVIG是一種治療
方法，用於治療由於免疫系統缺陷造成的抗體缺乏。但其機理仍然不清楚，而且不同的情況機理可能是不同的。IVIG在一些自身免疫性
疾病和風濕性疾病的治療中也有一定作用。
 3.2劑量/用法
給藥途徑為靜脈輸注，依疾病不同而劑量不同。
 3.3副作用
其副作用是罕見的，包括過敏反應、肌肉疼痛、輸液過程中發熱和頭痛，由於非感染性的腦膜反應（無菌性腦膜炎）導致的頭痛和嘔吐，
大約持續24小時。
這些副作用可自行緩解。有些患者，特別是川崎病和低白蛋白血症的患者，可能會在輸注IVIG時出現嚴重低血壓；這些患者需要由經驗
豐富的醫護團隊密切監測。
IVIGs是不含HIV、肝炎和大部分其他已知的病毒的。
 3.4兒科風濕性疾病主要適應症
川崎病
幼年皮肌炎
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 1 / 1