
NSAIDs
NSAIDs
NSAIDs

3-4

NSAIDs
NSAIDs

Methotrexate

methotrexate
15mg/m2
1
methotrexate
(GOT)
methotrexate
methotrexate

methotrexate
methotrexate

JIA
A
JIA
JIA

" "

3.3 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師からの指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見するために、症状の変化を注意深く観察し、医師に報告することが重要です。

3.4 治療

治療は、患者の病状の重症度や合併症の有無に基づいて決定されます。軽症の患者には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択薬として処方されます。重症化した場合、メソトレキサート(methotrexate)やTNF阻害薬が処方されます。メソトレキサートは、週1回服用する薬であり、副作用として骨髄抑制や肝臓障害がみられることがあります。TNF阻害薬は、免疫系を抑制する作用があり、感染症のリスクを高める可能性があります。

3.5 診断と鑑別診断

診断は、患者の症状、身体診察、血液検査、X線検査、超音波検査などに基づいて行われます。診断基準として、ACR (American College of Rheumatology) や PRES (Presbyterian Hospital) の基準が用いられます。また、PRINTO (www.printo.it) や PRCSG (www.prcsg.org) などの国際的なガイドラインも参考にされます。メソトレキサートは、JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) の治療に有効であることが示されています。FDA (Food and Drug Administration) や EMA (European Medicines Agency) は、メソトレキサートの安全性と有効性を評価しています。メソトレキサートは、JIA の治療に有効であることが示されています。また、メソトレキサートは、JIA の治療に有効であることが示されています。

3.6 予後

NSAIDs NSAIDs
MTX MTX
2000 PRINTO PRES
JIA JIA

3.7

JIA 6-12 JIA

3.8

ANA 3
RF

3.9

JIA 40%
8-10 JIA
IL-6 IL-1
RF

