



www.printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro

トランスジエネティック・トランスアクティブ・リウマチ症候群 (TRAPS) の診断

目的

1. TRAPS

1.1 定義

TRAPS は、家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。診断基準は以下の通りである。

1.2 診断基準

TRAPS は、以下の診断基準を満たす場合に診断される。診断基準は以下の通りである。

① 家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。

② 診断基準を満たす。

③ 診断基準を満たす。

1.3 診断基準?

TRAPS は、家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。診断基準は以下の通りである。

① 家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。

② 診断基準を満たす。

③ 診断基準を満たす。

1.4 診断基準?

TRAPS は、家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。診断基準は以下の通りである。

① 家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。

② 診断基準を満たす。

③ 診断基準を満たす。

1.5 診断基準? 診断基準?

TRAPS は、家族性発熱、発疹、リンパ節腫大、関節痛、2~3 週間持続する炎症性疾患である。診断基準は以下の通りである。

1.6 何故ですか？

TRAPSは、

1.7 何故ですか？

通常、2~3ヶ月以内に、
、
、
TRAPSは、
、
TRAPSは、14日以内に、
Aは、Aは、

1.8 何故ですか？

TRAPSは、

2. 何故ですか？

2.1 何故ですか？

TRAPSは、
、
IgDは、

2.2 何故ですか？

CRP、A、SAAは、
、
TNFRIは、

2.3 何故ですか？

NSAIDs TNF TNF IL-1

2.4

TNF and IL-1

2.5

TNF IL-1

2.6

2.7

2-3

2.8

TRAPS

2.9

TRAPS

3.

3.1

3.2 如何设置陷阱

陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。

3.3 TRAPS 如何设置陷阱

陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。

3.4 TRAPS 如何设置陷阱

陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。

3.5 如何设置陷阱？

陷阱

3.6 如何设置陷阱？

陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。

3.7 如何设置陷阱？

陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。50% 陷阱的设置需要根据不同的场景进行设置，不同的场景需要设置不同的陷阱。