https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro
少見的兒童原發性系統性血管炎
第？版本
 8.其他類型的血管炎和相似疾病
白細胞破碎性血管炎（也稱為高敏性或過敏性血管炎）：通常是指機體對過敏原異常反應而導致血管的發炎反應。在兒童中，藥物和感染
是最常見的誘發因素。本病主要侵犯小血管，皮膚切片下可以見到特異性的鏡下表現。
低補體性蕁麻疹樣血管炎：其特徵為遍佈全身的皮疹伴有癢感，與蕁麻疹相似，但皮疹的消退慢於皮膚過敏反應。血清學顯示補體水準降
低。
嗜酸性多血管炎（EPA，既往稱為Churg-Strauss syndrome症候群）：是兒童中極為少見的一種血管炎，可以有
皮膚和內臟血管炎的各種表現，並伴有氣喘，血液和組織中的嗜酸性粒細胞計數升高。
Cogan´s
症候群：是一種少見的疾病，主要侵犯眼睛和內耳，臨床特點為畏光、頭暈和聽力受損，也可以有其他部位血管炎的表現。
貝赫切特病(Behçet’s disease) 將在其他部分單獨講述。
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 1 / 1